

chaque côté du croupion, blanc. Les scapulaires ont le noir d'une teinte ardoisée.

A R.— Cette espèce est beaucoup plus rare que la précédente et se tient communément plus au Nord. Ses habitudes sont à peu près les mêmes que celles des autres canards de mer. Ses œufs à écaïlle très douce, sont d'un jaune verdâtre sale uniforme.

(A Continuer).

DESCRIPTION METHODIQUE DES ZOOPHYTES INFUSOIRES DU CANADA,

PAR LE DR. CREVIER, MONTREAL.

Exposé des milieux où se rencontrent les Vibrioniens, et des maladies particulières dont ils sont la cause excitante.

(Continuée de la page 349 du Vol. V).

Dans les fièvres Typhoïdes. — 1°. Le sang humain typhoïde, non putréfié, pris sur le vivant, détermine sur l'organisme du lapin des effets très appréciables ; 2° Le sang du lapin infecté de cette manière peut infecter à son tour le sang d'animaux de même espèce ; on produit ainsi des générations successives de Bactéries ; et plus ces générations sont répétées, plus ces Bactéries sont actives et les accidents rapides. 3° La zone immobile observée permet de diagnostiquer un sang malade dès le début de la maladie. On appelle zone immobile une couche de Bactéries et de points situés dans un même plan, et qui apparaissent à l'œil de l'observateur lorsque le liquide examiné n'est pas exactement au point ou foyer microscopique. Cette couche est formée de Vibrioniens devenus inactifs. La même chose se remarque au début de la fièvre variolense, de la fièvre puerpérale, des fièvres putrides, de la fièvre perniciense, de la fièvre pestilentielle, de la dysenterie, dans les abcès profonds accompagnés d'absorption du pus ou fièvre