

de tige jouit de propriétés égales à celles de l'écorce de racine, et nous nous croyons d'autant plus autorisé à tirer cette conclusion, que le docteur Desnoyers, expérimentant sur la racine, a poussé les précautions aussi loin que possible, en faisant arracher devant lui les grenadiers pour en avoir les racines dans le meilleur état possible.

Cet observateur obtint une moyenne bien moins favorable. M. le docteur Colin donne $\frac{1}{4}$ comme proportion moyenne des succès aux cas observés.

Voici la méthode à employer. Elle a assez d'importance dans ses moindres détails pour mériter une analyse complète.

Après avoir essayé sans succès l'extract éthéré et l'extract aqueux, nous avons vu les meilleurs résultats, ceux dont nous donnons les moyennes, s'obtenir avec l'apozème d'écorce de tige de grenadier.

Pour préparer cet apozème, on devra prendre deux onces d'écorces fraîches, les réduire en petits morceaux. Sur cette préparation on versera trois demiards d'eau bouillante, on abandonnera le tout pendant 24 heures, puis, le lendemain, on réduira à une chopine par l'ébullition.

Telle est la quantité indiquée d'ailleurs par Laboulbène, et qui a été adoptée comme un type commun.

On obtient ainsi un liquide amer et fort désagréable à prendre. Aussi, doit-on veiller à le donner bien froid, et faire prendre au malade, avant et après, un corps fortement sapide, sinon on s'exposerait à des vomissements.

Cet inconvénient existe d'ailleurs de même pour les préparations d'écorce de racine, mais n'existe que pour les sujets dont l'estomac présente une certaine susceptibilité.

On devra aussi le faire prendre en deux fois, avec intervalle de 20 minutes environ entre les deux doses; sinon la trop grande quantité du liquide peut être mal tolérée.

Il nous paraît presque indispensable de donner un purgatif. Le plus commode est certainement l'huile de ricin.

Nous avons admis comme règle de conduite de donner en tout cas le purgatif à la première colique, toujours avant la première selle, l'apozème devant agir sans doute simultanément sur l'intestin et sur son contenu.

Cette méthode a donné de bons résultats; il est à remarquer que sur nos trois cas d'insuccès, il en est deux où un retard insolite du purgatif est venu déranger les règles exposées plus haut.—*Lyon médical.*