

quelconque, à recevoir dans leur chemise cet aimable crustacé avec ses dix pattes en pinces et sa queue armée d'un dard, et nous sommes assez de leur avis.

Parmi les plantes que nous trouvâmes en fleur furent : *Philadelphus grandiflorus*, encore une plante de nos anciennes cultures, *Dioscorea villosa*, *Euphorbia corollata*, puis le Tulipier, *Liriodendron tulipifera*. Ce dernier est un arbre de 70 à 80 pieds de hauteur. La richesse de son feuillage, la beauté de ses fleurs, qui ressemblent assez à des Tulipes, et son port majestueux, en font un des plus beaux arbres que nous ayons encore rencontrés. Nous en trouvons plusieurs pieds, mais tous ceux que nous voyons portant des fleurs, sont à tronc nu dans le bas, jusqu'à une hauteur considérable, de sorte qu'il nous est impossible de nous procurer une seule de ces fleurs ; nous nous contentons d'examiner les pétales que le vent entraîne et qui jonchent le sol tout alentour.

Nous constatons aujourd'hui la levée de 9 à 10 graines de coton que nous avons semées le 12, pour suivre de plus près le développement de cette plante.

*Samedi, 22 Avril.*—Un bon vent frais venant du Nord-Ouest nous invite encore aujourd'hui à une nouvelle excursion, et c'est de l'autre côté de la rivière que nous portons nos pas. Nous faisons la capture de plusieurs Hémiptères intéressantes et d'un petit serpent grisâtre de 10 à 12 pouces de longueur, qu'on appelle ici *Oak-snake*, parce qu'on le rencontre d'ordinaire sous les Chênes ; c'est le *Coluber ordinatus* de Linné. Nous faisons aussi la rencontre d'un arbre qui nous intéresse vivement ; c'est le *Cercis Canadensis*. Cet arbre, pour porter le nom de notre pays, ne s'y voit certainement pas dans sa partie inférieure, dans la province de Québec. Il peut mesurer de 15 à 20 pieds, et quoique appartenant à la famille des Légumineuses (Pois, Fèves, etc.), il est à feuilles simples. Celles-ci, cordées à la base, sont minces, légères, et acuminiées au sommet. Le fruit est un légume carré, ailé sur les angles, de 2 à 3 pouces de long. Les fleurs qui se montrent avant le développement des bourgeons au printemps, étaient déjà