

Ferme expérimentale de Brandon, Man.

BETTERAVES FOURRAGÈRES.

Il a été essayé à Brandon en 1907 dix variétés de betteraves fourragères. Elles ont été semées en rayons espacés de deux pieds, et les jeunes plantes ont été éclaircies de manière à être à intervalles de 10 à 12 pouces dans les rangs. Le semis a eu lieu le 22 mai, et l'arrachage le 23 octobre.

Variétés essayées.	Produit moyen.		Produit en 1907.	Variétés essayées.	Produit moyen.		Produit en 1907.
	tonn.	lb.			tonn.	lb.	
(Cinq ans.)	tonn.	lb.		(Moins de 5 ans.)	tonn.	lb.	
1 Prize Mammi Long Red...	32	1,578	27	1,704	Perfectum Mammi Long Red		
2 Half Sugar White.....	31	1,397	24	576	(1 an).....	24	840
3 Yellow Intermediate.....	30	1,987	23	992	Crimson Champion (1 an)...	20	128
4 Gate Post.....	30	826	25	536	Mammi Red Intermediate (1		
5 Selected Yellow Globe.....	28	74	22	1,498	an).....	17	1,640
6 Giant Yellow Intermediate	27	497	23	520			
7 Giant Yellow Globe.....	25	794	19	16			

Le rendement moyen des dix variétés de betteraves fourragères essayées à la ferme expérimentale de Brandon en 1907 a été 22 tonnes 1,936 lb. par acre.

CAROTTES

Il a été essayé à Brandon en 1907 six variétés de carottes des champs. Elles ont été semées en rayons espacés de deux pieds, et les jeunes plantes ont été éclaircies de manière à être à intervalles d'environ 4 ou 5 pouces dans les rangs. Le semis a eu lieu le 22 mai, et l'arrachage le 29 octobre.

Numéro.	Variétés essayées.	Produit moyen.		Produit en 1907.	Numéro.	Variétés essayées.	Produit moyen.		Produit en 1907.
		tonn.	lb.				tonn.	lb.	
	(Cinq ans.)	tonn.	lb.			(Cinq ans.)	tonn.	lb.	
1	Improved Short White...	26	888	24	460	4	Mammi White Intermediate	22	528
2	Ontario Champion.....	24	1,280	20	480	5	White Belgian.....	20	1,032
3	Giant White Vosges.....	22	1,232	18	960	6	Half Long Chantenay.....	18	80

Le rendement moyen des six variétés de carottes à la ferme expérimentale de Brandon en 1907 a été 19 tonnes 207 lb. par acre.

BETTERAVES À SUCRE.

Il a été essayé à Brandon en 1907 trois variétés de betteraves à sucre. Elles ont été semées en rayons espacés de deux pieds, et les jeunes plantes ont été éclaircies de