

une trentaine d'interventions chirurgicales, j'ai vu, avec Ricard et Labbey, 2 cas d'ulcus situé à l'union de la première avec la seconde partie du duodénum. D'après Souligoux, ses collègues de l'hôpital Tenon: Ménétrier, Caussade, Gouget, Parmentier, qui surveillent d'une façon fort attentive toutes les autopsies de leur service, lui ont affirmé que pour eux l'ulcère du duodénum était environ cinq fois moins fréquent que l'ulcus gastrique.

Il semblerait donc, en somme, que si l'ulcus du duodénum est peut-être plus fréquent que ne l'admettait H. Collin, il reste notablement plus rare que l'ulcus gastrique d'une façon générale, mais plus particulièrement encore que l'ulcus pylorique et juxta-pylorique.

IV. *Tableau symptomatique de l'ulcus duodénal vrai.*—Si l'ulcus duodéno-pylorique et même l'ulcus duodénal situé dans le voisinage immédiat du pylore se confond complètement par sa physiologie pathologique et par sa séméiologie avec l'ulcus pylorique et juxta-pylorique, il n'en est pas de même pour l'ulcus duodénal vrai, c'est-à-dire pour l'ulcus situé en plein duodénum, à distance du pylore. Les observations rapportées récemment à la Société de chirurgie par H. Delagènière, Tuffier et Souligoux, et celles que nous avons nous-mêmes présentées à la Société médicale des hôpitaux, auxquelles nous pouvons ajouter un cas récent d'une netteté schématique, pourraient servir à en établir le tableau clinique, et ce tableau, nous le reconnaissons avec plaisir, ne diffère pas dans ses traits essentiels de celui qu'avait tracé Bucquoy, il y a près d'un quart de siècle, dans sa magistrale étude.

Il convient du reste de décrire des formes cliniques différentes, suivant que l'ulcus duodénal est récent ou invétéré, simple ou compliqué.

*Ulcus récent.*—Ici il convient de distinguer la *forme latente* et la *forme commune*.

*Ulcus latent.*—L'ulcus latent du duodénum est relativement fréquent. Depuis longtemps on sait que la perforation est une