

courir le risque d'aggraver l'hémorrhagie et de se créer des embarras par la suite. Le docteur Guéniot pose la limite du temps pendant lequel un avortement normal doit se faire et après lequel le médecin doit intervenir: 2 jours pour la délivrance abortive des deux premiers mois; 24 heures pour celles des troisièmes et quatrièmes mois; 12 heures pour celle du cinquième; 6 heures pour celle du sixième mois. On ne doit cependant pas avoir trop de confiance dans ces limites car il n'est rien de plus varié que l'avortement. Ce sont plutôt les accidents qui doivent nous guider. Dans ces cas les indications sont de favoriser les contractions utérines, la dilatation du col et le décollement du placenta. Un bon agent: le seigle ergoté, est à notre disposition (10 à 15 grains toutes les 2 ou 3 heures. Mais il faut pour cela qu'une partie du placenta soit engagée: autrement il surviendrait des contractions spasmodiques du col, et nous obtiendrions un effet tout opposé à celui que nous attendions. Dans les cas graves, le tampon, tout en arrêtant l'hémorrhagie par l'action irritante qu'il exerce continuellement sur le col, favorise les contractions utérines. Qu'on y joigne le seigle ergoté et on aura alors le bénéfice combiné des deux procédés. Du cinquième au sixième mois, l'hémorrhagie peut devenir très-grave. C'est alors que nous devons intervenir quant même, en faisant la dilatation forcée soit avec les doigts, soit avec les dilateurs en usage. Nous devons, avec la main, aller chercher le placenta en ayant le soin qu'il n'en reste pas une partie dans la matrice. Il est bon, en même temps, de donner une dose de seigle ergoté afin d'aider aux contractions utérines et par là au décollement du placenta. Une fois l'hémorrhagie arrêtée et l'avortement complété, il convient de combattre l'anémie, suite de la maladie et de recourir à un traitement hygiénique et reconstituant. Ici, le fer, le quinquina sont essentiellement recommandés. Ajoutons y une alimentation solide et progressive et des injections détersives si les sécrétions vaginales sont odorantes et nous aurons rempli toutes les indications.

(La suite au prochain numéro.)

---