Médecine Vétérinaire

Maladies des Volailles

CACHEXIE ou DEPERISSEMENT. RACHITISME. — La cachexie est le plus souvent la conséquence d'un état de maladie des animaux, comme la tuberculose par exemple.

Elle est alors sans traitement. Mais dans d'autres cas, elle résulte d'une mauvaise nourriture et de mauvaises conditions hygiéniques (poulailler et basses-cours insalubres).

Les volailles dépérissent à vue d'œil et deviennent anémiques en peu de temps, leur démarche est chancelante, leur plumage terné, la crête pâle, etc.

Traitement. — Donner aux volailles un local parfaitement propre et une nourriture reconstituante et abondante, grains (avoine, petit blé), pain, etc.

CORYZA. — (Coryza simple, coryza contagieux. Morve, Roupie).

1° Coryza simple. — Écoulement liquide et mousseux des narines, yeux chassieux, toux fréquente.

Traitement. — Tenir dans un endroit sec et chaud.

2° Coryza contagieux (Morve, Roupie). — Écoulement des narines épais, jaunâtre, purulent, yeux couverts de fausses membranes purulentes, respiration gênée.

Traitement. — Fumigations de goudron et crétyl. Lavage des plaies à l'eau crétylée à 3 p. c., salyphéniquée. Désinfection au sulfate de cuivre.

CRISE DE LA MUE ou PICAGE. — La mue n'est pas une maladie, c'est un phénomène naturel qui consiste dans la chute des plumes et leur remplacement par d'autres ainsi que par du duvet destiné à protéger l'oiseau contre le froid.

Cette chute des plumes s'accompagne d'un état général de faiblesse des volailles qu'il est nécessaire de combattre aussitôt.

Il faut donc :

1° Les préserver du froid et de l'humidité ;

2° Leur donner une nourriture fortifiante ainsi qu'une bonne eau de boisson.

Voici quelques renseignements sur l'époque de la mue des divers oiseaux.

1° Poules. — La mue des poules s'effectue en automne. Les jeunes poulets devront donc

être l'objet des soins minutieux de la part de la fermière. Bonne nourriture: maïs et avoine.

2° Pigeons. — La mue des pigeons dure une partie de l'année: six mois environ.

3° Dindonneaux. — C'est la crise du rouge qui apparaît vers l'âge de deux mois environ.

Beaucoup de sujets succombent. L'oiseau devient triste, nonchalant, les plumes sont hérissées, il se déplace difficilement, sa marche est lente, finalement une diarrhée fétide se déclare et l'animal meurt.

Traitement. — Une bonne nourriture; œufs cuits durs, farine de maïs, pain trempé dans du vin, ortie blanche hachée. Ajouter à cette nourriture, donnée sous forme de pâte, quelques cuillerées à soupe de sang de bœuf desséché ou de poudre de viande.

(à suivre)

Cuisine Pratique

Toutes les semaines, il sera donné une ou plusieurs bonnes recettes de cuisine.

PETITS POIS A LA MENAGERE. — Faites fondre 4 onces de beurre frais dans une petite marmite en fer, ajoutez une pinte et demi de petits pois écossés, sel, une pincée de sucre, 2 oignons verts noués, et 2 œufs. Je la t'ue émincés; placez la marmite sur feu très doux; couvrez avec une assiette ayant un peu d'eau dedans. Cuisez les pois ainsi sans addition de liquide, en les remuant de temps en temps. Quand ils sont cuits, liez-les avec un peu de beurre pétri dans un peu de farine; finissez-les avec un morceau de beurre pur et une pincée de sucre.

C'est une excellente recette pour la saison.

BOEUF A LA MENAGERE. — Prenez une vingtaine d'oignons de moyenne grosseur, faites-les roussir dans une casserole avec un bon morceau de beurre; quand ils auront pris une belle couleur, mettez une pincée de farine ou de la chapelure, remuez environ 5 minutes, sans endommager les oignons; ajoutez une bonne tasse de bouillon, votre morceau de bœuf entier, sel, poivre, muscade, et un bouquet garni; faites mijoter le tout à petit feu pendant près de 2 heures; servez le bœuf sur un plat en rangeant les oignons autour.