

♂—Entièrement noir avec les pattes rousses; le thorax partagé en côtes comme dans la ♀.

Capturé à Toronto par M. Brodie, sur le *Rubus strigosus*.

Après le genre AULAX p. 235, ajoutez le suivant.

Gen. SYNERGE, *Synerges*, Hartig.

Antennes de 15 articles dans les ♂ et 14 dans les ♀. Thorax aciculé transversalement en avant de l'écusson; celui-ci rugueux. Flancs à peine scabres. Pédoncule abdominal formé de 2 parties, la première en forme de cylindre court et la 2e plus grande en forme de cône tronqué, ayant sa pointe plus étroite en arrière. Second segment formant presque à lui seul tout l'abdomen, à part le pédoncule. Valves de la tarière redressées. Ailes à radiale fermée supérieurement avec l'aréole au milieu.

Une seule espèce rencontrée.

Synerge fausse-Rhodite. *Synerges Rhoditiformis*, Walsh Proc. Ent. Soc. Phil. II, 499.

♀—Long. .10 pce. Jaune pâle ou roussâtre; l'extrémité des mandibules, une tache sur le vertex se continuant sur le collier et sur le milieu du mésothorax presque jusqu'à l'écusson, le métathorax avec une grande tache sur l'abdomen; noir. Antennes jaunes. Thorax avec fines aculations transverses, surtout près de l'écusson. Valves de la tarière redressées mais ne dépassant pas la ligne dorsale. Pattes de la couleur du corps.

Capturé à Toronto sur le chêne blanc.

Gen. KLEIDOTOMA, Westw. XII, p. 237.

Aux 2 espèces décrites, ajoutez la suivante.

3. Kleidotome très-petit. *Kleidotoma minima*, nov. sp.

♀—Long. .08 pce. Noir brillant, les pattes jaune roussâtre. Ailes hyalines à nervures peu distinctes, bordées d'une longue frange brune. Très remarquable par la longue frange brune de ses ailes.

(A continuer.)