

ment inoffensif qu'on peut donner sans compter à tous les brightiques.

L'emploi des régimes mixtes hypochlorurés, dans lesquels comme M. Vidal l'a montré avec M. Javal, on peut faire entrer, suivant les médications, des aliments divers, permet de réduire la quantité des chlorures et de mesurer à volonté les trois principes fondamentaux : graisse, hydrate de carbone et albumine tout en restreignant la quantité de liquides au gré du médecin.

L'Hémoptysie essentielle supplémentaires des Règles existe-t-elle

Par M. Alfred MARTINET

Peu de symptômes ont une valeur séméiologique aussi caractérisée que l'hémoptysie. De façon quasi constante, elle extériorise une affection pulmonaire ou cardiaque, ou une diathèse hémorragique avérée ou latente. Il est toutefois une modalité d'hémoptysie sur laquelle on a beaucoup discuté et dont la signification diagnostique et pronostique peut être toute différente : c'est l'hémorragie supplémentaire des règles.

Pour nombre d'auteurs, de phthisiologues, en particulier, cette hémoptysie supplémentaire des règles serait, de façon constante, symptomatique d'une bacillose pulmonaire évidente ou menaçante.

On observe, en effet, ce symptôme, soit isolé, soit répété, dans maints cas de bacillose pulmonaire féminine; l'observation en est banale.

Mais il nous est arrivé aussi de l'observer dans des cas où toute idée d'affection organique pouvait être cliniquement écartée et