

RSES



de du liniment
aments endolo-
calme et guérit.
mmation et ra-
age du membre.
de la famille.

IENT
LA DOULEUR
ARD

RENARDS
ARGENTÉS

couples de renards noirs
e très bon prix.

Main St. Moncton, N.B.

PORTANT

otre crème ou
e vous serez
hauts prix du
out temps de

ux fournisseurs
satisfaits de la
ous les accom-
s hauts prix
ons.

ous payons le
crivez-nous de
avons de gros
mplir.

otre Crème à

le Dairy,
Ltd.

aint-Louis
ébec

chateau Frsntenac
ey Hale Etc.

de J.-B. Re-
nc. Paiements
par mois.

z 1½ à 2c par
seulement sur

s 3c de plus
douce.

l'Eucalyptus)

remède très doux et
ur toux, bronchites,
beaucoup les per-
thème. Si votre phar-
ne l'a pas, écrivez
ose, 126 rue Garnier,

par la poste 60 sous.

GRANDE CULTURE

Les Travaux sur la Ferme

Faire le foin, voilà la principale occupation des cultivateurs durant ce mois. Quoique, dans les comtés du sud de la province, la plus grande partie du trèfle ait déjà été coupé dans les comtés du nord, il atteint à peine le degré de maturité convenable.

N'attendez pas trop longtemps pour le trèfle; il vaut mieux le couper trop tôt que trop tard, car la seconde récolte vous rendra au delà de ce qui pourrait manquer à la première.

Cela ne veut pas dire, cependant, que la seconde récolte (regain) de trèfle soit d'aussi bonne qualité que la première, et, sur le marché de Londres, du foin de trèfle de seconde coupe vaut toujours près de \$5 de moins que celui de première coupe.

Dès que le trèfle est fauché, laissez-le se faner sur le sol, retournez-le pour sécher l'autre côté, mettez-le en veillottes aussi vite que possible et laissez-le en veillottes jusqu'à ce qu'il soit prêt à être engrangé ou mis en meule. Tout ceci n'est qu'une nouvelle répétition, sous une autre forme, de ce que nous avons déjà dit, nous le savons bien, mais il y a encore tant de cultivateurs qui font mal leurs foins de trèfle que ces conseils gardent toute leur importance.

Orge.—Dans l'ouest de la province, l'orge sera probablement bien mûre vers la fin du mois de juillet. Quant à l'orge destinée à la fabrication du malt, elle ne pourrait guère être trop mûre. Cette année, il y aura probablement, au moment de la moisson, beaucoup de jeunes trèfles dans les champs d'orge, par suite des pluies abondantes que nous avons en mai. Là où l'orge est cultivée pour la brasserie, nous conseillons de la faucher haut pour que les andains ne contiennent que le moins d'herbes possible; mais si le grain est destiné à l'alimentation du bétail, fauchez bas et ne laissez pas la récolte trop longtemps sur pied. La paille et le trèfle traités convenablement feront un bon fourrage.

Récoltes sarclées.—Les récoltes sarclées demandent en juillet beaucoup d'attention de la part du cultivateur. Profitez des premières heures du jour, avant la disparition de la rosée, et pendant que le foin se repose, pour leur donner les soins requis.

S'il est dangereux de faire passer la houe à cheval trop profondément entre les rangs de blé d'Inde, puisque cette récolte doit mûrir aussitôt que possible, s'il est bien vrai qu'en coupant les racines d'une plante on retarde sa maturité, cela n'a cependant pas de grands inconvénients dans le cas des betteraves à vaches, choux de Siam, etc.; en effet, lorsque les racines de ces dernières plantes sont coupées, elles ne tardent pas à repousser avec plus de vigueur, et, pour cette espèce de récolte, la question de maturité n'a pas grande importance. En conséquence, comme les sarclages et binages entre les rangs ont pour effet d'améliorer la terre pour les cultures de grains et de fourrages suivantes, il convient de faire passer la houe à cheval entre les rangs de plantes-racines (navets,

etc.), aussi profondément que possible, en commençant d'abord par un binage peu profond et en augmentant peu à peu la profondeur jusqu'à 5 pouces au moins. Essayez de mettre ce conseil en pratique, et ensuite nous sommes sûrs que vous ne laisserez plus les plantes en repos.

Fourrages verts.—Vers le milieu de juillet, les vaches ne tardent pas à vous faire remarquer que si vous ne voulez pas voir diminuer leur rendement en lait, il est nécessaire de pourvoir à leur nourriture. Avec le fourrage de vesces et d'avoine donné en abondance, en outre du peu de nourriture que les vaches pourront trouver sur leur pacage desséché, celles-ci se trouveront bien nourries. Mais avec des aliments remplis d'eau comme le blé d'Inde-fourrage, il faut donner quelque aliment plus substantiel, et on ne trouvera rien de mieux que la moulée de pois, à raison de deux livres par vache et par jour; la même quantité de tourteau de coton serait d'un emploi excellent.

Pâturages.—Les pâturages supporteraient mieux les sécheresses s'ils étaient mieux divisés, de manière à être pacagés régulièrement et successivement. Au lieu de cela, on les laisse ronger complètement en une seule fois, et on les garde ainsi, sans leur donner une seule chance de se refaire.

Mil.—Il en est de même des prairies que l'on laisse pacager après les foins. Si l'herbe est du mil, elle sera vite arrachée. Le mil croît comme les plantes bulbeuses, un peu comme les échalottes, et, en temps de sécheresse, le bétail en a bientôt détruit les racines. Pour notre part, nous voudrions voir le mil remplacé par quelques autres herbes, excepté le cas où on le cultive pour le marché; une herbe qui ne fournit pas de pâturage, et ne donne qu'une récolte par saison, n'est guère avantageuse pour le cultivateur, surtout lorsqu'on considère que l'usage principal de ce fourrage est limité à la nourriture des chevaux; car aujourd'hui tout le monde sait, même les plus routiniers savent, que le trèfle est bien préférable au mil pour les vaches et les moutons. De fait, beaucoup d'autres fourrages sont tout aussi bons pour l'alimentation qu'une grande partie du foin de mil tel qu'on le vend sur nos marchés.

Réduit les Entorses

Pour chevaux qui souffrent d'inflammation ou d'enflure des articulations, de foulures, meurtrissures, d'excroissances molles, furoncles, mal d'occiput, javart, fistule et plaies venimeuses, employez Absorbine. Economique, efficace et ne produit pas d'ampoules ni ne fait tomber le poil et le cheval peut travailler pendant le traitement. Brochure gratuite. \$2.50 la bouteille chez votre pharmacien ou votre marchand général. W. F. Young, Inc., Immeuble Lyman, Montréal



CULTIVATEURS

Confiez-nous vos expéditions de

CRÈME

Nous sommes acheteurs à l'année. Nous payons les plus hauts prix. Economisez sur les frais de transport en expédiant à

LA LAITERIE CHAMPLAIN Ltée

180 RUE DORCHESTER, - QUÉBEC, P. Q.

ACTUALITÉ AVICOLE

PANIER AUX LETTRES DES AVICULTEURS

Rep. à M. L.-V.-M. de Joliette.—La destruction des fourmis dans les jardins et les potagers peut se faire à l'aide de l'une ou l'autre des préparations suivantes, selon les conditions dans lesquelles on opère.

1. Injecter dans les fourmilières une solution d'eau très sucrée dans laquelle on fait dissoudre un gramme d'arsénite de sodium, par pinte d'eau.
2. Diapozar dans des assiettes avec morceaux de pain ou d'éponge, à proximité des fourmilières ou sur les chemins des fourmis, un apât préparé comme suit.

Dans une pinte d'eau, mettre 1 livre de sucre et 6 grammes d'arsénite de soude. Faire bouillir jusqu'à dissolution complète, puis ajouter une cuillerée à soupe de miel. Laisser refroidir et verser dans des assiettes tel que conseillé précédemment.

Question.—Je voudrais faire la sélection de mes poules. Pourriez-vous m'indiquer la meilleure manière de procéder à cela dans votre courrier des aviculteurs?

Réponse.—L'espace nous manque pour vous donner tous les détails sur la sélection. Demandez la circulaire No 42 sur la sélection, au Service des publications, Ministère de l'Agriculture, Québec, et on se fera un plaisir de vous l'envoyer gratuitement.

Question.—A quel âge puis-je laisser les canetons se baigner?

Réponse.—Huit à dix semaines pour ceux que vous désirez conserver pour la reproduction. Quant à ceux que vous voulez vendre pour la chair, vaudrait mieux ne pas les laisser aller à l'eau du tout. Pour mesurer leur suffolement d'eau pour s'abreuver car ils en ont besoin. Les récipients doivent être assez profonds pour qu'ils puissent s'y plonger le bec en entier.

Question.—J'ai une poule qui, depuis trois jours, se tient droite comme un canard. Elle a beaucoup de difficulté à marcher. Qu'est-ce que cela peut bien dépendre?

Réponse.—Cette pose est due à l'obstruction de l'oviducte soit par un œuf déformé ou trop gros qui ne peut en sortir ou encore à cause d'œufs brisés dans cet organe. Placez l'anus de la poule au-dessus de la vapeur, pendant quelques instants et injectez l'huile d'olive. Si c'est un œuf qui est la cause de l'obstruction il sortira de l'oviducte en peu de temps et la poule reprendra sa pose normale. Si ce sont des œufs brisés le mieux que vous ayez à faire sera d'abattre votre poule.

Question.—Plusieurs de mes poules Leghorn ont une bosse sous une patte. Cela les fait boiter et elles semblent souffrir. Ce sont de bonnes pondueuses, et je ne voudrais pas les perdre. Un conseil s'il vous plaît?

Réponse.—Prenez un bistouri ou petit couteau bien aigu et ouvrez cette bosse en croix, c'est-à-dire dans les deux sens; il en sortira probablement du pus et un liquide rougeâtre, même un peu de sang; vous y constaterez une matière assez dure et blanchâtre, ressemblant à du nerf, enlevez complètement cette matière, lavez avec du peroxyde d'hydrogène et appliquez ensuite de l'iode; pour préserver la plaie de la terre et saletés, enveloppez la patte avec un coton stérilisé en ayant soin de laisser les bords de la patte libres. Vous pourrez renouveler les pansements chaque jour jusqu'à complète guérison.

(Su l'eu au bas de la colonne suivante)

CONCOURS DE PONTE DE L'EST DE QUÉBEC

Sous la direction de la Station Expérimentale
Ste-Anne de la Pocatière, Qué.

Semaine finissant le 4 juillet, 1929

Propriétaire	Race	T. Total des points
1 Asselin J. O.	L. B.	1437 1430 9
2 Burton G. C. N.	"	1279 1284 5
3 Calder C. D.	"	1424 1420 7
4 Fair service John	"	1228 1345 5
5 Robertson R. A.	"	1599 1568 8
6 Bégin & Dubé	P. R. B.	1348 1330 9
7 Boulanger Arthur	"	1325 1305 7
8 Cloutier Gabriel	"	1277 1102 0
9 Corriveau Raoul	"	1495 1576 2
10 Fournier Hilare	"	1248 1260 0
11 Laurel Poultry Farm	"	1210 1236 7
12 Letendre Joseph W.	"	1269 1235 4
13 Macdonald Collège	"	1486 1486 2
14 Poirier Alphé	"	1286 1356 5
15 Sta. Exp. La Ferme	"	1480 1602 8
16 Sta. Exp. Ste-Anne	"	1737 1436 8
17 Sta. Exp. Ste-Anne	"	1374 1312 2
18 Strong William	"	1316 1501 7
19 DeRoy Affaire	P. L. R.	1337 1363 6
20 Robertson R. A.	W. B.	1093 1135 9
		27449 27344 0

CONCOURS DE PONTE DE L'OUEST DE QUÉBEC

Sous la direction de la Station Expérimentale
Dominion de Lennoxville, P. Q.

Semaine finissant le 3 juillet, 1929

Propriétaire	Race	Total des points
1 J. H. Jackson	W. I.	1161 1291 1
2 H. Henry	"	557 569 2
3 J. E. Barnett	"	1528 1682 7
4 Laurel Poultry Farm	"	1240 1343 9
5 Circle-Bar P. Farm	"	1241 1369 2
6 Fred Bell	"	1206 1228 4
7 Macdonald Collège	"	928 982 4
8 O. Morin	"	1245 1236 9
9 C. D. Calder	"	1331 1398 0
10 W. M. Parsons	"	1291 1392 3
11 Riverside Poultry Farm	"	1360 1480 6
12 P. L. Green	W. R.	1036 1184 8
13 Victor E. Nablo	B. R.	1197 1274 7
14 W. A. Carr	"	1320 1523 3
15 Experimental Farm	"	1393 1359 1
16 H. R. Drow, R. R. 3	"	1273 1481 8
17 Mrs. Alex. Mackay	"	1325 1368 9
18 L. A. Gnaedinger	"	1199 1204 1
19 Moss R. G. Knight	W. W.	1385 1481 6
20 Bond Little, R. R. 1	"	1181 1377 6
		24397 26352 7

châtre, ressemblant à du nerf, enlevez complètement cette matière, lavez avec du peroxyde d'hydrogène et appliquez ensuite de l'iode; pour préserver la plaie de la terre et saletés, enveloppez la patte avec un coton stérilisé en ayant soin de laisser les bords de la patte libres. Vous pourrez renouveler les pansements chaque jour jusqu'à complète guérison.

AVIS IMPORTANT

Les personnes qui ont des fermes à vendre et qui n'ont pas encore communiqué leur nom aux agronomes sont priées de remplir la formule ci-dessous et de la retourner au Ministère de l'Agriculture, à Québec, dans le plus bref délai. Le nouveau programme agricole de l'Honorable M. Perron comporte le recensement de toutes les fermes à vendre, exploitées par le propriétaire, sous location ou abandonnées, dans le but d'aider aux pères de famille à établir leurs enfants plus facilement et à des distances raisonnables du foyer paternel. Le Ministère de l'Agriculture servira ainsi d'intermédiaire entre ceux qui désirent acheter des fermes. Tous les renseignements sont strictement confidentiels et doivent être adressés au chef du Service des Agronomes.

FERMES A VENDRE

Comté de		Paroisse de					
Nom du propriétaire	Adresse postale	Superficie totale (arpents)	Superficie totale à la charrue (arpents)	Texture moyenne du sol	Prix \$	E.L.A.	Autres Renseignements.

Abréviations:— E—Exploitée. L—Louée. A—Abandonnée.

11

11

11