

Pour remédier à cet inconvénient, M. Martin a cherché à **lutter** directement contre le bacille lui-même. Le sérum anti-diphthérique étant surtout anti-toxique et donnant peu de résultat **dans** la destruction des bacilles, il a préparé un sérum antimicrobien, par injection au cheval de corps bacillaires chauffés à 100°, que l'on peut employer sous forme liquide en pulvérisations, où à l'état sec sous forme de pastilles qu'on laisse fondre **dans** la bouche.

MM. Labbé et Canot donnent des Statistiques encourageantes **en** faveur de l'emploi de cette nouvelle méthode.

Journal de Médecine et de chirurgie pratiques.—Janvier.

MM. les docteurs Sergent et Lechevallier qui ont pu suivre **en** une collaboration médico-chirurgicale constante, une centaine de cas de plaies de la poitrine, consacrent tout un article au **traitement** de ces plaies, en mettant particulièrement en **évidence**, les phases secondaires et lointaines de ces accidents. Pour eux, l'extraction du corps étranger est de règle; et l'**intervention** grâce aux perfectionnements techniques, serait simple **benigne** et sans danger.

Les complications qui sont à redouter au stade secondaire de l'évolution de ces plaies sont de deux ordres: les complications suppuratives et les non-suppurées. Parmi ces dernières ils ont **rencontré** du côté de la plèvre: l'hemothorax et la pleurésie séro-fibrineuse; du côté du poumon: les hémoptysies secondaires, les bronchites, la broncho-pneumonie et l'œdème du poumon.

Les suppuratives sont les pleurésies purulentes, les abcès du **poumon** et les gangrènes. En général, les plaies de poitrine **laissent** après elles des séquelles dont l'intensité et la variété sont