

d'une purée de tomates. On peut verser dans ce mélange une certaine quantité de potage que l'on chauffe légèrement, en tournant constamment le mélange à l'aide d'une cuillère. On la donne ainsi à petites doses en augmentant peu à peu, sans jamais dépasser 300 grammes par jour. Le jus de viande obtenu par expression de la viande est un bon aliment pour les tuberculeux anorexiques. Il est supérieur à la pulpe de viande.

La poudre de viande est connue de tous les médecins. On peut l'obtenir à la maison en faisant sécher au bain-marie de la pulpe de viande fraîche qu'on réduit en poudre au moyen d'un moulin à café. La valeur alimentaire est bonne : 100 grammes de poudre équivalent à 375 grammes de viande fraîche. On la délaye dans du bouillon chaud à la dose d'une à trois cuillérées à soupe. Quant aux extraits de viande, leur valeur nutritive est limitée. V. g. la *soma-tose* que l'on conseille de donner à la dose de 20 à 40 grammes par jour.

Les aliments gras sont indispensables et parmi eux l'*huile de foie de morue* jouit d'une faveur particulière, mais on la donne à doses trop minimes. Suivant Jaccoud, les doses 2 c. à 5 par jour sont plus nuisibles qu'utiles. Il conseille 100 à 200 grammes par jour en deux doses.

On peut y ajouter, suivant Dieulafoy, 1 à 2 milligrammes de strychnine pour aider à la digestion.

Il y a des signes d'intolérance qu'il faut connaître. Ainsi une diarrhée rebelle et une hypertrophie du foie consécutives à l'ingestion d'une grande quantité d'huile de foie de morue doivent nous engager à en suspendre l'emploi momentanément.

La *glycérine*, préconisée par Jaccoud, donne de bons résultats, mais il faut qu'elle soit *pure*, c'est-à-dire neutre, et il ne faut pas dépasser la dose de 40 à 60 grammes par jour, car on observe, au delà, de l'agitation, du délire, etc., et quelquefois, en l'absence de tout incident pyrétogène, une élévation de température supérieure à 38 degrés. On peut y ajouter quelques gouttes de menthe, de rhum ou de cognac.

Quand aux autres aliments, le chocolat, le pain, les pâtes alimentaires, les légumes, les pommes de terre, les aliments sucrés, les fromages, leur valeur nutritive est connue déjà.

Les œufs constituent un aliment de choix à la portée de tous, et peuvent être absorbés de toute façon. En somme, dit l'auteur, "le régime alimentaire du tuberculeux doit être basé sur l'observation individuelle du malade et varier suivant les indications."

J. A. LESAGE:

CHIRURGIE

Tic douloureux de la face et exan en pathologique de 15 ganglions de Gassor réséqués.

Qui de nous n'a rencontré un de ces cas désespérants de tic douloureux de la face. Avec quelle persistance cette névralgie trigéminal se rit d'habitude de nos efforts thérapeutiques est de mémoire à ceux qui en ont tenté la guérison. Pour multiples qu'en soient les causes et non moins nombreuses les panacées, la guérison est rare.

Que ce soit la forme hystérique, si bien étudiée par Gilles de La Tourette ; ou celle dépendant le l'épilepsie vraie, que Trousseau a bien mise en lumière ;