

adepte de la voie périnéale, nous dit même: "This pocket "with its freshly torn blood vessels and its open lymph spaces "becomes at once a receptacle of putrid urine, and it is to "be relieved by the most inadequate and unscientific attempts "at drainage."

Je ne concède peut-être ici qu'une chose, et encore: que le drainage par une ouverture périnéale se faisant en partie déclive devrait, théoriquement, être plus parfait. En pratique? ce n'est pas mon opinion. La preuve n'est-elle pas d'ailleurs dans ce fait, que la tumeur sus-pubienne gagne chaque jour du terrain sur la périnéale, pour les calculs: et si jamais il fut vessie en besoin de drainage, ce fut la vessie infectée d'un calcul.

Quelques-uns, Parner Symms entr'autres, reprochent à la sus-pubienne d'exposer les malades à une incontinence consécutive. En toute honnêteté il n'y a qu'à faire le relevé en détail des observations de la thèse Albarran-Petit, de beaucoup le meilleur et plus complet mémoire sur la question, pour voir combien nombreux sont les opérés qui longtemps sont ennuysés par des "mictions impérieuses!"

Je ne saurais non plus accepter cette allégation que "la "convalescence de la prostatectomie sus-pubienne est prolongée, désastreuse et dangereuse (P. Symms)." L'expérience m'a montré que les opérations par les deux voies nous donnaient parfois des ennuis: mais que ce n'était pas la règle.

D'ailleurs, pour résumer, je vous présente le résultat de 45 ablations totales de la prostate pratiquées par Freyer, de Londres: et ce maître anglais a autorité en maladies urinaires puisqu'il publiait, une couple d'années à peine, le résumé de son expérience découlant de 1,050 opérations sur la vessie pour calculs seulement.

Sur 45 opérés, variant de 57 à 39 ans, à chacun desquels il enleva la prostate au total, pesant de $\frac{3}{4}$ à $10\frac{1}{4}$ oz., il n'a eu à enregistrer que 5 morts répartis comme suit:

- 2 de manie aiguë, après que la plaie était fermée;
- 1 de syncope, le 10e jour, alors qu'en pleine convalescence;
- 1 de coma, vieux brightique qu'il était avant l'opération;
- 1 de pneumonie, sept jours après l'opération.