

MOTOR NERVES OF THE EYE-BALL.

Accommodation and Reflex

Iridoparalysis.

Cycloplegia.

Ptoſis.

視遠近之功亦失、因眼斜之故、是以視一而見二、系不全癱者亦有之、如僅提上瞼肌及上直肌受患、或睛肌及睛簾受患而外、他肌皆無恙等是。上瞼墜 此爲腦系病常且要之狀、其原即 (甲) 胎生而無法可療之者。(乙) 第三顱系病者。(丙) 大腦病所致者、其外質之司所、於今尙未之識。(丁) 癰病所致、此類兩偏皆患、且有其他之癰狀。(戊) 上瞼假墜、即和系病之故、此而外且有司絡癱之狀、如受患之偏熱、皮紅、瘀腫、瞳縮等是。(己) 自起肌枯者、其面肌受累則兩眼之上瞼皆墜。(庚) 柔弱之婦人、或暫有此狀、早晨尤常見之。

睛肌癱 睛肌癱者、視遠近之功則因之而失、物之近者、不能見之、而能見及於遠、此當掛凸眼鏡以療之、其眼之受累、或一或二、兩眼皆患者、多即其系本結病、癱者睛肌癱實爲之早而常之狀、於失和動症亦有之。睛簾癱 (甲) 瞳不因視遠近而大小、此其試之之法、當令病者先視遠而後視近。

(乙) 激反應失、其激應之路循視系徑而至其末、而後乃至於第三顱系之結、復循此系而至睛結、而後乃循睛系而至於眼、試之、兩眼宜有先後、即