

**FISSURE ANALE.**—Nous signalons d'une façon toute spéciale à l'attention du lecteur un traitement de la fissure anale peu connu, et qui a donné à l'auteur M. le docteur Chapelle (d'Angoulême) 14 guérisons sur 14 applications. Il consiste à toucher de une à quatre fois, à un intervalle de quelques jours, l'exulcération au moyen d'un pinceau de blaireau trempé dans la mixture suivante : chloroforme 3 grammes dans alcool 26 grammes. La douleur est très vive, mais de très-courte durée.—*Lyon Médical.*

**PRÉCAUTION À PRENDRE DANS LES INJECTIONS HYPODERMIQUES,** par CHOUPE.—Des accidents sont possibles si, par un malheureux hasard, l'injection est faite dans l'intérieur d'une veinule. Pour les éviter, après avoir constaté la perméabilité de l'aiguille, il faut l'introduire séparément, et dans le cas où il sortirait du sang, piquer ailleurs ou enfoncer un peu plus l'aiguille. (*Gaz. méd.*)—*Lyon méd.*

**PROCÉDÉ NOUVEAU POUR DÉCOUVRIR LE SANG DANS LES LIQUIDES, SUR LES TISSUS, ETC,** par ALMEN.—Supposons qu'il s'agit d'examiner une urine suspecte : dans une éprouvette on mélange quelques centimètres cubes de teinture de gâïac avec parties égales d'essence de térébenthine, puis on y ajoute une petite quantité de l'urine à examiner ; si elle contient du sang, n'y en eût-il que des traces, il se forme instantanément une coloration bleue plus ou moins intense. Avec de l'urine normale ou renfermant de l'albumine ou du pus, cette coloration bleue ne se produit pas.

Lorsqu'on voudra découvrir le sang sur des tissus, du bois, etc., on agira comme il suit : dans une éprouvette on mêle parties égales d'essence de térébenthine, d'une solution de 5 grammes de résine de gâïac dans 100 grammes d'alcool rectifié, puis on y ajoute la solution de la tache, préalablement traitée par l'acide acétique dilué et chauffé. Si la tache, quelque petite qu'elle soit, a été produite par le sang, le liquide dans l'éprouvette prendra instantanément une coloration bleue intense. (*Jahresber d. phys. vereins zu Frankfurt*, et *Revue de thérapeutique. médico-chirurg.*) *Lyon médical.*