

La manifestation locale a une grande tendance à se transporter d'une articulation à une autre ou sur des organes internes.

Quelque fois la fièvre persiste quand les symptômes ont cessé. La fièvre accompagnant le rhumatisme ne devient jamais typhoïde.

*Diagnostic entre le rhumatisme et la goutte.*—Celle-ci est fixe sur une ou plusieurs articulations des orteils. Elle a pour cause la suranimalisation du sang par des principes azotés qui s'épanchent dans les petites jointures et en causent l'inflammation. Ainsi l'alimentation riche est la cause de la goutte tandis que celle du rhumatisme est une alimentation détournée ou defectueuse sous l'effet du froid humide. Le rhumatisme n'est pas fixe mais change facilement de place. Il envahit surtout les grosses articulations.

*Complications.*—Les plus importantes comme les plus fréquentes sont les phlegmasies cardiaques. Elles sont presque toujours présentes dans les violentes attaques de rhumatisme, mais assez rares dans les formes légères ou peu fébriles. L'endocardite et la péricardite commencent fréquemment en même temps que l'inflammation externe.

On connaît les lésions graves qu'entraînent ces redoutables complications. Aussi faut-il au début et dans le cours d'un rhumatisme examiner le cœur attentivement. Il faut remarquer ici que tous les bruits anormaux du cœur ne signifient pas qu'il y a inflammation de cet organe. Quelques uns de ces bruits se sont dissipés d'eux mêmes à la suite de la médication dirigée contre la diathèse rhumatismale seulement, comme aussi avec la méthode expectante. Ils étaient produits alors par le changement survenu temporairement dans la composition du sang.

La durée est de quelques semaines à trois ou quatre mois. La première attaque est généralement moins longue. La terminaison a lieu souvent par des sueurs abondantes et de mauvaise odeur ou par un flot d'urine sédimenteuse.

#### ETIOLOGIE.

Le rhumatisme ne se montre pas avant la puberté. C'est depuis ce temps jusqu'à quarante ans qu'il est plus fréquent sur les individus.

Plus le sujet est jeune plus il est apte à avoir des complications cardiaques.

*Causes.*—Causes prédisposantes : hérédité, tempérament lymphatico sanguin, prédisposition ou tendance à l'affaiblissement