

leur étude de notre faune, que pour profiter de la santé et du temps à notre disposition pour pousser nos investigations aussi loin que possible. Une fois disparu, nous doutons fort qu'il se trouve quelqu'un avec les aptitudes et la volonté de continuer une tâche aussi ardue et aussi peu rémunérative que celle que nous poursuivons depuis plus de douze ans.

FAUNE CANADIENNE

LES INSECTES.—HYMÉNOPTÈRES.

(Continué de la page 102).

Fam. v. BRACONIDES. *Braconidæ*.

Tête courte, transversale, généralement plus étroite que le thorax. Labre le plus souvent caché par le chaperon, celui-ci tantôt fortement échancré et tantôt allongé en bec.

Antennes généralement assez longues, filiformes ou sétacées, presque toujours grêles, à premier article toujours plus fort et plus allongé que les autres, le deuxième toujours plus petit que le premier et que le suivant et jamais accompagné de cet article rudimentaire qui dans les Ichneumonides s'interpose entre le 2e et le 3e.

Thorax généralement plus large que la tête, mais le plus souvent atténué en avant de manière à former une espèce de cou plus ou moins allongé. Les lobes composant le mésothorax sont presque toujours très distincts, et le médian prolongé en avant des deux autres. L'écusson, le métathorax, les pattes, varient comme dans les Ichneumonides.

Les ailes antérieures ont toujours la cellule discoïdale extérieure ouverte, de sorte qu'il n'y a qu'une seule nervure récurrente : c'est là le caractère le plus saillant qui