

*Herba* pedalis, ubique pariter lanosa. *Caudes* plures ex eodem radice, simplices costati, erubescetes. *Folia* adeo crassa ut venæ nullæ transparent plana nec ullo modo ensiformia nihilominus costâ erubescenti validâ sub apice evanidâ munita: *radicalia* primordially palmaria spatulata et obtusissima; mox exsurgunt alla versum apicem elliptica vel lanceolata et acuta, basi tamen semper angustis et nil nisi costas ulatas exhibentibus: *caulina* minora, remota, sessilia, semi-amplexicaulia lanceolato-linearia, acuminata, acuta, summa in bracteis sensim diminuta: *omnia* dentata, dentibus nunc raris et ex glandulis parvis acutis omnino formatis, nunc frequentioribus et ex substantia folii constructis sed tunc etiam glandulis apiculatis. *Folia* juniora interdum revoluta sunt. *Corymbus* terminalis circiter 10-florus, pedunculis calyce vix duplo longioribus, tomentosis, bracteis linearibus acuminatis suffultis. *Calyx* cylindricus squamis paucis laxis minoribus calyculatus. Squamarum apices nigerrime. *Floruli* disci calyce longiores, antheris stigma superantibus. *Flosculi* radii patentes calyce duplo longiores, limbis lanceolatis integerrimis vel emarginatis. *Pappus* simplex sessilis. *Receptaculum* nudum.

*Hab.* At Bloody Fall, where the Esquimaux were destroyed by the Northern Indians that accompanied Hearne, whence the specific name.

313. *Cineraria integrifolia*: Willd. iii. p. 2082. Pursh. ii. p. 528. (H.)

314. *C. palustris*: Willd. iii. p. 2080. (H. W. A.)

315. *C. frigida*: deciduo-tomentosa, foliis ovatis obsolete dentatis: radicalibus petiolatis, caule ascendente unifloro. (B.)

*Radix* repens. *Caulis* palmaris et ultra, simplex striatus, uniflorus tomento laxo deciduo vestitus. *Folia* plerumque ovata obtusa remote obsoleteque dentata 3-vel 5-nervosa, marginibus sub revolutis; *sub-radicalia* minora, glabra, in petiolum longum attenuata; *caulina media* majora tomento ut in caule vestita; *caulina suprema* minora, linearia. *Flos* luteus. *Calyx* simplex pilis glanduliferis villosus, laciniis linearibus acutis longitudine disci. *Flosculi* radii calyce duplo longiores 3-dentati.

316. *C. Lewisii*: *Erigeron compositum*: Pursh. ii. p. 535. (B.)

317. *Aster*? exscapus: foliis radicalibus lineari-lanceolatis adpresso pilosis flore sessili altioribus. (C.)

*Radix* fusiformis superne in caudices breves crassos reliquis foliorum obtectus divisa. *Folia* radicalia aequipollicaria angusta acuta, inferne sensim attenuata, integerrima, utrinque pilis adpressis vestita. *Flos* magnus albidus in summo caudicis sessilis foliisque paulo brevior. *Calyx* adpresso-imbricatus, laciniis angustis lineari-subulatis acutis marginibus membranaceis ciliatis. *Flosculi* disci calyce paulo longiores pappo breviores. *Fl.* radii calyce plus duplo longiores angusti, lineares apice dentibus 3 conniventibus.

*Hab.* at Carlton House.

318. *A. salicifolius*: Willd. iii. p. 2030. Pursh. ii. p. 549. (W.)

319. *A. graminifolius*: Pursh. ii. p. 545. (H.)

320. *A. paludosus*: Willd. iii. p. 2033. Pursh. ii. p. 551. (H.)

321. *A. paniculatus*: Willd. iii. p. 2035. Pursh. ii. p. 551. (W.)

322. *A. cordifolius*: Willd. iii. p. 2036. Pursh. ii. p. 552. (W.)

323. *A. salsuginosus*: caule unifloro, foliis lineari-obovatis acutis sub-integerrimis venosis, calycibus laxè imbricatis linearibus acutis disco vix duplo radio plus triplo brevioribus. (W.)

*Herbaceus*. *Caudes* plures ex eadem radice, dodrantes erecti aut ascendentes firmi simplices purpurei sed pilis brevissimis sub-incanis. *Folia* sessilia lineari-obovata lanceolatae plerumque acuta, integerrima