

TRAVAUX ORIGINAUX

APPENDICITE ET SALPINGO-OVARITE ¹

C. VÉZINA, M. D.

Assistant à la clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu.

Je n'ai pas l'intention de vous présenter un travail sur la salpingo-ovarite ou sur l'appendicite; d'autres plus autorisés que moi pourront le faire et avec avantage.

Je voudrais tout simplement vous rapporter quelques observations de malades prises à l'Hôtel-Dieu, observations qui vous feront voir qu'il nous arrive de confondre ces deux affections, l'une avec l'autre, étant donné leur localisation et la similitude des symptômes qu'elles peuvent présenter; puis nous verrons quels sont les signes qui nous permettent de les différencier l'une de l'autre.

L'appendicite et la salpingo-ovarite sont deux affections assez fréquentes chez la femme. Si le diagnostic de l'appendicite chez l'homme est ordinairement chose facile, il peut présenter au contraire certaines difficultés chez la femme. En effet, dans le voisinage de l'appendice sont situés deux organes, l'ovaire et la trompe,

1. Travail lu à la Société Médicale de Québec.

Syphilis
Artério-sclérose, etc.
(Ioduro Enzymes)
Todore sans Iodisme

Todurase

de COUTURIEUX
57, Ave. d'Antin, Paris.
en capsules dosées à 50 ctg. d'Io-
dure et 10 ctg. de Levurine.
