

FAUNE CANADIENNE.

LES OISEAUX.

(Continuée de la page 9).

III. Fam. des FRINGILLIDES. *Fringillidæ*.

Primaires 9 ; bec court, fort, et se terminant brusquement en pointe ; commissure fortement anguleuse à la base. Tarses scutellés par devant, mais ne portant sur les côtés que deux plaques indivises, qui s'unissent en arrière, en formant une espèce de carène.

Cette famille, très nombreuse en genres et en espèces, se partage en 4 sous-familles, qu'on peut distinguer par les caractères suivants.

Mandibule supérieure aussi large que l'inférieure :

1ère primaire égale à la 2e ou plus longue. 1. COCCOTHAUSTINES.

1ère primaire plus courte que la 2e, égale

à la 5e 3. PASSERELLINES.

Mandibule supérieure plus large que l'inférieure,

bec généralement droit. 2. SPIZELLINES.

Mandibule supérieure plus étroite que l'infé-

rieure, bec très recourbé... 4. SPIZINES.

Sous-famille des COCCOTHAUSTINES, *Coccothraustinae*.

Bec très fort, variable dans sa forme, à mandibules égales en largeur ; narines latérales, plus ou moins cachées par des petites plumes, point de soies à la base. Ailes pointues, d'un tiers plus longues que la queue qui est fourchue, la 1ère primaire égale à la 2e ou plus longue ; les tertiaires égales ou peu plus longues que les secondaires. Pieds courts et un peu faibles, ongle postérieur plus long que le médian antérieur.