

Pour atteindre la cavité utérine, il convient d'élargir le canal cervical. On a introduit des crayons médicamenteux contenant du tannin, du nitrate d'argent, de l'iodoforme. On a fait aussi des injections intra-utérines de liquides modificateurs, astringents ou caustiques: il est prudent de tâter au préalable la susceptibilité de l'organe avec de l'eau distillée. Ces moyens atteignent difficilement le fond des cryptes glandulaires où s'abritent les microbes pathogènes.

Schröder, au moyen de la sonde de Frisch, fait des irrigations avec un litre d'eau contenant 30 grammes d'acide phénique ou 1 gramme de sublimé corrosif.—Lorsque ces injections ne suffisent pas, il procède sous le chloroforme au raclage, en promenant la curette, sans exercer une trop grande violence, sur la face antérieure puis sur la postérieure et les bords latéraux de la cavité utérine. En courbant un peu la cuiller et en exerçant une pression sur la paroi abdominale en sens inverse, on atteint aisément le fond de l'utérus et ses angles.

Injections anti-septiques immédiatement avant et après l'opération. Repos au lit pendant quatre jours; le cinquième jour, il reprend les injections phéniquées pour influencer la muqueuse de néoformation. Dans les cas rebelles, tous les deux jours, il fait une injection de 3 grammes de teinture d'iode.

"Exécuté avec les précautions minutieuses d'antisepsie, ce procédé est sans danger," dit Schröder: il a fait le raclage et l'injection de milliers de fois et n'a perdu qu'une seule malade... avant l'introduction des procédés antiseptiques.

Le traitement du catarrhe du col est le même que pour l'endométrite catarrhale du fond, mais d'une application plus facile. Les érosions du museau de tanche guérissent assez bien par les douches vaginales de 38° à 45° C., qu'on peut rendre médicamenteuses: tannin, pagliari, une cuillerée à café d'acide salicylique dissous dans une cuillerée à soupe d'alcool pour un litre d'eau (Frisch)—et par quelques cautérisations à la teinture d'iode, au crayon de nitrate d'argent. Schröder vante surtout l'acide pyro-ligneux rectifié, additionné de 3 à 4 0/0 d'acide phénique. Il découvre le col avec un spéculum de Fergusson, dans lequel il verse un peu du liquide et qu'il laisse quelques minutes en contact avec la muqueuse. Ce procédé ne peut atteindre les lésions intracervicales.

Les *fungosités* réclament un traitement plus énergique: il faut agir plus profondément et il reste à choisir entre les scarifications, qui dégorgent les tissus, vidant les kystes—et la destruction des glandes par les acides forts, la curette ou le thermocautère.

Après la destruction des tissus pathologiques, il y a des soins à prendre pour que les tissus de nouvelle formation aboutissent au type normal et se revêtent d'épithélium pavimenteux.

Enfin, on peut se trouver dans l'obligation d'exciser cette