Cette cystotomie sera faite par la voie hypogastrique et pour exposer, en bonne lumière, le bas-fond vésical, il est recommandable de pratiquer la "section transversale" de l'organe et suspendre les lèvres de la paroi incisée par des fils fixés à des points " ad hoc" de l'écarteur trivalve de Guyot.

L'opération pratiquée immédiatement fit voir la présence d'un papillôme de la grosseur d'une noisette, dont l'ablation fut faite, aux ciseaux, jusqu'à la couche musculeuse. La muqueuse fut réparée avec des points, au catgut, séparés, la vessie fermée et la cavité de Retzius drainée avec un tube en caoutchouc.

La convalescence fut simple et sans incidents et le dernier mot - celui du pronostic - reste au microscore.

LES ANEMIES DE L'ENFANCE

Les anémies du premier âge sont habituellement causées par les maladies aigües de cette période de la vie. Les exanthèmes spécialement sont suivis d'une viciation de la qualité du sang, et une convalescence trainante ne dépend souvent que de cette seule condition. De plus, la fréquence des stigmates physiques ou des infirmités à la suite d'une rougeole, d'une scarlatine, d'une diphtérie ou de toute autre maladie de l'enfance, peut souvent être attribuée aux soins impropres ou insuffisants peneant ce très important stage de ces realedies à la couvelescence. de ces maladies: la convalescence.

de ces maladies: la convalescence.

L'on doit reconnaître que la fonction hématogène très active dans l'enfance est cependant très sensible à toutes les influences inhibitrices, dont les plus communes sont les toxines engendrées au cours des maladies aigües. Quand l'orage représenté par la rougeole, la scarlatine ou toute autre maladie similaire est passé, il faut qu'une période de reconstruction snive.

L'action du Pepto-Mangan (Gude) est très marquée et les enfants répondent vite à cette action reconstituante. L'hémoglobine augmente et les globules rouges se multiplient repidement.

bules rouges se multiplient rapidement.

Le Pepto-Mangan (Gude) est donc un tonique de grande valeur de l'enfance. Il n'est jamais réjeté par l'estomac le plus faible. De 10 gouttes à 2 cuillérées à thé, mieux dans du lait.