

marqués que bien souvent on ne voit pas la nécessité de retenir la malade au lit quand celle-ci demande à se lever. La thrombose des veines des membres peut souvent passer inaperçue pour différents motifs: Tantôt parce que le caillot n'obture pas complètement la lumière du vaisseau, tantôt parce que l'affaiblissement de la malade émousse en elle la sensibilité.

La malade, qui s'est levée, essaie de faire quelques pas et brusquement elle s'affaisse et meurt. C'est l'embolie qui l'a tuée.

4^e La *quatrième* forme de phlegmatia dite *abortive*, diffère des autres par son peu de retentissement tant dans ses symptômes que dans son pronostic; c'est une phlegmatia atténuée, mitigée. Dans cette forme la douleur est légère et débute souvent par le pied. Souvent localisée à ce dernier, elle peut gagner le mollet: jamais elle ne remonte plus haut. L'œdème ne dépasse pas les limites de la douleur; c'est-à-dire qu'il reste localisé au pied, si la douleur n'affecte que cette partie du membre inférieur; il gagne le mollet, si la douleur affecte ce dernier. L'œdème est modéré. L'évolution de la forme abortive est courte; elle se fait en huit ou dix jours. Il y a toujours comme dans les autres formes menace d'embolie. Dans cette forme il n'y a pas de récurrence.

Evolution et pronostic. — La phlegmatia est une affection à marche lente, durant de trois semaines à un mois et même plus. Les accidents disparaissent progressivement, dans l'ordre suivant: fièvre, douleurs, œdème, impotence fonctionnelle.

De temps en temps, il se fait une nouvelle poussée de fièvre, en même temps que les douleurs reviennent un peu plus fortes. Presque toujours l'affection est unilatérale. Dans certains cas, *l'autre membre se prend*, alors que le premier est presque désenflé. Le second membre peut être aussi touché alors par la phlébite primitive est encore en pleine évolution. Une reprise de la température signale l'apparition de cette complication qui augmente singulièrement la durée de la maladie. Exceptionnellement, la thrombose atteint le membre supérieur, l'œil, la face, etc. Quand la jambe droite est prise primitivement, la gauche le sera infailliblement.

La *terminaison habituelle* est la guérison, mais le pronostic est toujours un peu réservé à cause de la possibilité des embolies.