

III. *La dyspepsie dépendant d'altération de l'innervation* s'observe dans les cas d'hypochondrie, d'hystérie, de nostalgie, de névralgie, etc. La sécrétion du suc gastrique dépend tout autant de l'influence nerveuse que la sécrétion de la salive et beaucoup d'autres fonctions des différents organes. Les cas de dyspepsie, à la suite de l'usage prolongé de l'opium ou d'autres narcotiques, appartiennent à cette classe, quoiqu'il y ait dans de tels cas l'action d'une influence mécanique qu'on ne doit pas perdre de vue. Par l'usage des narcotiques les mouvements péristaltiques de l'estomac sont dérangés, diminués et quelquefois presque entièrement détruits, la nourriture s'accumule dans l'estomac, et ne cause pas seulement une sensation de pesanteur et de plénitude, mais produit en outre des conditions telles que celles qu'on a déjà mentionnées sous le nom de "dyspepsie par les ingesta."—*A continuer.*

DIARRHÉE DES ENFANTS.

1o. La diarrhée due aux mauvaises qualités du lait de la mère ou de la nourrice.

Elle se reconnaît à l'aspect séreux, verdâtre, à la répétition fréquente des garde-robes, accompagnées de coliques et d'expulsion de gaz.

On la traite en faisant modifier le régime alimentaire de la mère ou de la nourrice, ou en faisant changer le mode d'alimentation de l'enfant.

2o. La diarrhée de la dentition est la plus commune et la moins périlleuse.

Elle se reconnaît à ce que, lorsqu'elle existe, les enfants conservent leur bonne humeur, leur vivacité et leur appétit, et la diarrhée diminue quand la salivation se manifeste.