

seau pointu, conique. Bouche en dessous de la tête; tubuleuse, sans dents.

Deux espèces dans notre faune.

Caudale à peine lobée, dos d'un rouge jaunâtre . . . 1. **brevirostris**.
Caudale distinctement lobée, couleur olive foncé. . . 2. **Oxyrinchus**.

1. **Esturgeon à museau court.** *Acipenser brevirostris*. Le suc — Vulg. *Esturgeon commun*. Angl. *Albany beef*, à New York. — Long. 5 à 6 pieds. Corps très élevé à la nuque. Tête aplatie, s'abaissant obliquement jusqu'à l'extrémité du museau qui est robuste et médiocrement pointu. Corps portant des rangées d'écailles cornées, radiées, épineuses. Yeux arrondis, à pupille verticale. Quatre barbillons rangés en travers sous le museau en avant de la bouche. Dorsale consistant en une série de tubercules au nombre de 9, larges et aplatis, peu soulevés; les écailles latérales au nombre de 39, en forme de losanges; le reste de la peau rendu rude par de petits points granuleux. Dos d'un rouge jaunâtre, les côtés d'un rouge olivâtre.

Commun dans les grands lacs et dans le fleuve. Chaire généralement fort estimée et se rapprochant beaucoup de celle du veau, aussi la qualifie-t-on à New-York de bœuf d'Albanie, *Albany Beef*, de l'endroit où on les prend d'ordinaire dans la Rivière Hudson. Le lac St. Pierre et Gentilly sont, pensons-nous, les endroits du fleuve où l'on prend d'ordinaire les plus beaux Esturgeons et en plus grande quantité.

L'Esturgeon est également un poisson de mer et d'eau douce, car remontant dans les fleuves pour y frayer, il y passe souvent la plus grande partie de l'année.

2. **Esturgeon à nez pointu.** *Acipenser oxyrinchus*, Mitchill. — Vulg. *Escargot*, *Esciller*; Angl. *Sharped-nosed Sturgeon*. — Long 6 à 10 pieds. D'un brun gris en dessus, argenté sur la partie inférieure des côtés, blanc en dessous. Pupilles noires, iris jaunes. Corps allongé, pentagonal. Peau granuleuse, avec 5 rangs d'écailles cornées, ces écailles plus ou moins épineuses, surtout dans les jeunes sujets, et portant des stries rayonnant du centre à la circonférence. Tête aplatie en dessus, légèrement déprimée entre les yeux, et se terminant en pointe sur l'occiput dans les jeunes sujets. Bouche inférieure, à lèvres protractiles, lobées, précédée d'un rang transversal de quatre forts barbillons; museau assez pointu.

Dorsale échancrée, située tout à fait en arrière, peu en avant de la