

dité quand l'expérience n'est pas derrière lui. Aucune des critiques qui ont été dirigées contre la *microbiomanie* et ses applications thérapeutiques n'atteint ses travaux.

Son œuvre théorique est absolument intacte, et quant aux applications pratiques qui en découlent, l'illustre Huxley les a appréciées en ces termes : " Les découvertes de M. Pasteur suffisaient, à elles seules, pour couvrir la rançon de guerre des cinq milliards payés par la France à l'Allemagne en 1870."

HOPITAUX.

HOPITAL NOTRE-DAME, MONTRÉAL.

Traitement de la chorée par le bromure de potassium et le chloral.—Epilepsie; médication bromurée.—Myélie aiguë; mort; autopsie.

*Traitement de la chorée par le bromure de potassium et le chloral.—*Emma D**, 16 ans, est admise à l'hôpital, salle Ste. Marie, no. 29, souffrant de chorée limitée au côté gauche. Cette malade a déjà été traitée dans nos salles en 1881. L'histoire du cas, telle que relatée alors, se lit comme suit :

"Emma D**, 14 ans, fut prise de mouvements choréiques vers janvier 1879. Ces mouvements étaient limités au côté gauche (bras et jambe), la face étant parfaitement calme. Un an après, le bras et la jambe du côté droit furent pris à leur tour des mêmes mouvements, pendant que ceux-ci cessaient dans le côté gauche. Au bout de neuf mois, les mouvements abandonnèrent le côté droit pour revenir à gauche où ils se maintinrent jusqu'en février 1881, époque à laquelle, sous l'influence d'un traitement, tout mouvement convulsif cessa. La malade fut bien portante pendant près de six mois, puis la chorée se montra de nouveau, encore au côté gauche. Elle dura depuis deux mois quand la patiente fut admise à l'hôpital. Les mouvements sont aujourd'hui assez limités; la face est encore parfaitement calme; l'état général bon. La malade n'a jamais eu de rhumatisme articulaire aigu. L'auscultation ne révèle aucun souffle anormal du côté du cœur. On prescrit deux minimes de liqueur de Fowler, trois fois par jour, que l'on augmente bientôt à cinq minimes. Au bout de quinze jours de traitement, l'état de la patiente s'est déjà sensiblement amélioré."

Cette malade laissait en effet l'hôpital après un mois de traitement (novembre 1881), semblant parfaitement guérie. La dose d'arsenic avait été progressivement réduite à deux minimes de la solution de Fowler. La guérison se maintint jusqu'en mai 1883. Durant cet intervalle, la malade fut atteinte (octobre 1882) de rhumatisme articulaire aigu qui persista durant six mois. Elle ne peut dire quel traitement on lui a fait suivre alors.

Vers le mois de mai 1883 les mouvements choréiques se manifestant de nouveau, toujours du côté gauche, Emma fut admise à l'hôpital le 25 juillet, comme il est dit plus haut.

La face est calme; le bras et la jambe gauches sont seuls affectés.