

9. Si l'applicant a eu une ou plusieurs attaques de gravelle et accuse plus ou moins de douleur sourde à la région rénale, et si enfin l'urine est plus ou moins trouble par la présence du pus, l'application doit être rejetée.

10. Si l'applicant ayant eu des attaques de gravelle, cinq ans se sont écoulés depuis la dernière attaque, l'urine restant parfaitement normale et aucune douleur ne se faisant sentir du côté du rein, le risque peut être accepté.

11. Si l'applicant a dépassé l'âge de cinquante ans et si la miction se fait parfois avec plus ou moins de lenteur et de difficulté, le jet étant petit, bifurqué ou vertical et s'arrêtant quelquefois brusquement avant la fin, s'il est obligé de se lever chaque nuit régulièrement pour vider sa vessie et s'il est sujet à des accès périodiques de miction fréquente, le risque ne doit pas être accepté, même dans le cas où l'urine elle-même serait absolument normale.

12. Si l'urine renferme du sucre, l'application doit être rejetée.

13. Si l'urine est trouble par mélange de pus ou de sang, l'application doit être également rejetée.

“ L'Institut Pasteur ” de New-York.

Nous avons reçu de la part de M. le Dr GIBIER, directeur de l'Institut Pasteur, de New-York, le premier rapport annuel de cette institution, et nous nous hâtons d'en communiquer le détail à nos lecteurs.

Du 18 février 1890 au 18 février 1891, 828 personnes, mordues par des chiens ou des chats, se sont présentées pour traitement. Ces sujets peuvent être divisés en deux catégories :

1° Pour 643, il fut prouvé que les animaux qui les avaient mordus n'étaient pas enrégés. Ces sujets furent en conséquence renvoyés, après traitement de la morsure quand la chose fut jugée nécessaire.

2° Dans 185 cas le traitement anti-rabique fut mis en œuvre, la rage chez les animaux qui avaient mordu ayant été prouvée, soit cliniquement, soit par suite d'inoculations faites dans le laboratoire, et, dans beaucoup de cas, par la mort d'autres personnes ou animaux mordus par les mêmes chiens. *Aucun cas de mort par rage n'a été rapporté chez les sujets ainsi inoculés.*

Les sujets pauvres ont été traités gratuitement.

Les malades sont répartis comme suit, par États, Territoires, &c.

New-York.....	81
New-Jersey.....	27
Massachusetts.....	16
Connecticut.....	11
Illinois.....	9