

Saisir solidement la partie antérieure de la langue entre le pouce et l'index de la main droite, nus, ou revêtus d'un linge quelconque, d'un mouchoir de poche, par exemple (pour empêcher le glissement), et exercer sur elle de fortes tractions répétées, successives, cadencées ou rythmées, suivies de relâchement en imitant les mouvements rythmés de la respiration elle-même au nombre d'au moins vingt par minutes.

Les tractions linguales doivent être pratiquées sans retard et avec persistance durant une demi-heure, une heure et plus.

20 *Méthode de la respiration artificielle.*

Coucher la victime sur le dos, les épaules légèrement soulevées, la bouche ouverte, la langue bien dégagée.

Saisir les bras à la hauteur des coudes, les appuyer assez fortement sur les parois de la poitrine, puis les écarter et les porter au-dessus de la tête, en décrivant un arc de cercle; les ramener ensuite à leur position primitive, en pressant sur les parois de la poitrine.

Répéter ces mouvements environ vingt fois par minute, en continuant jusqu'au rétablissement de la respiration naturelle.

Il conviendra de commencer toujours par la méthode de la traction de la langue, en appliquant en même temps, s'il est possible, la méthode de la respiration artificielle.

D'autre part, il conviendra concurremment de chercher à ramener la circulation en frictionnant la surface du corps; en flagellant le tronc avec les mains ou avec des serviettes mouillées; en jetant de temps en temps de l'eau froide sur la figure: en faisant respirer de l'ammoniaque ou du vinaigre.

Céphalée des diabétiques et des néphrétiques.

P.—Poudre de feuilles de digitale.....	2 grammes
Antipyrine.....	20 “
Caféine.....	8 “
Benzoate de soude.....	4 “
Chlorhydrate de cocaïne.....	} à 1 gramme.
Poudre d'opium.....	
Ecorce pulvérisée de quinquina.....	} à p. f. pilules No 100.
Glycérine.....	

M.—A prendre une à cinq pilules par jour.—*Médecine moderne.*

Céphalalgie de l'anémie.—Prof. H. A. HARE.

P.—Acide salicylique.....	30 grains.
Pyrophosphate de fer.....	5 “
Phosphate de soude.....	1 grain.
Eau distillée.....	3 onces fl.

M.—Dose: Toute cette dose à prendre toutes les trois heures.