

FAUNE CANADIENNE

HYMÉNOPTÈRES

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

(Continué de la page 311).

68. Ichneumon obscur. *Ichneumon caliginosus*, Cress.
Proc. Ent. Soc. Phil. iii, p. 144.

♀ — Long. .55 pce. Noir, l'abdomen plus ou moins bleuâtre, court et passablement robuste. Antennes enroulées avec un anneau pâle au milieu. L'écusson blanc; aréole centrale du métathorax en carré irrégulier. Ailes fuligineuses, le stigma brun-roussâtre. Pattes sans aucune tache, les hanches postérieures sans brosse. Abdomen court, en oval allongé, noir-bleuâtre, le post-pétiole ponctué.

Pris 4 spécimens ♀.

69. Ichneumon corbeau. *Ichneumon corvinus*, Cress.
Trans. Am. Ent. Soc. vi, p. 145, ♀.

♀ — Long. 35 pce. Noir brillant, faiblement ponctué, tête sans aucune tache. Antennes fortes, à articles courts, enroulées, noires avec un petit anneau blanc vers le milieu. Écusson aplati; métathorax densément ponctué, excavé en arrière, ses angles tuberculeux, son aréole centrale grande, en occupant toute la longueur. Ailes légèrement enfumées. Pattes avec les cuisses renflées, les tarsi brun-rou-