d'hier, qui nous comble aujourd'hui de ses inépuisables bienfaits.

Donnons donc les instructions qui doivent être suivies et de l'observance desquelles dépend le succès.

PRECAUTIONS CONTRE LA DIPHTERIE

I

Indications generales.

La diphterie est une maladie essentiellement contagieuse.

Toute relation des enfants avec les diphthériques doit être évitée.

On ne connaît aucun remède preservatif de le dipliterie il est inutile de compter sur la prétendue efficacité des preparations recommandées.

Il faut surreiller les enfants de manière à constater dès le debut l'apparition du mal de gorge, de tout mal de gorge.

Le médecin doit être demandé sans retard, quand même il n'y a pas certitude de la maladie.

Il faudra suivre les ordonnances du médecin qui seront les suivantes.

Π

Conduite à tenir quand un cas de diphthéric se déclare dans une famille.

Il faut éloigner de suite toute personne de la maison et surtout les enfants.

L'enfant sera placé dans la pièce de la maison la plus reculée, dans le haut de préférance.

Le statistique demontre que la con-

tagion est très limitée quand cette precaution est prise.

Il y aura contact le moins possible avec le malade; embrasser un enfant c'est s'inoculer le poison.

Le garde malade ne restera pas trop longtemps dans la chambre, ayant soin de se laver dans une solution désinfectante. (acide borique 120 grains, eau une demi-chopine,) et d'aller au deliors respirer l'air pur.

Ш

MESURES DE DÉSINFSCTION

Les crachats, les sécrétions des narines, seront reçus dans une solution de chlorure de zine ou sulfate de fer (une once par demiard d'eau.)

Les linges, vêtements seront passés à l'eau bouillante pendant une demi heure.

Tous les objets à l'usage du malade seront sonmis au même lavage.

Le desinfection de la chambre se fora toujours, qu'il y ait guérison ou nor.

Souvenous nous que cette desinfection doit durer 24 heures.

Le désinfection de la chambre et l'isolement rencontrent toujours une résistance malheureuse.

Au non de ceux que le maladie a épargnés jusqu'ici, mères que la douleur n'a pas epargnées, ordonnez vous mêmes l'isolement d'abord et là désinfection ensuite: ce sont la les seules moyens que nous avons à notre disposition : leur emploi vous protegera, comme le vaccin protège contre la variole.