

| Noms français officiels  | Autres dénominations de vente admises | Noms scientifiques   |
|--|---------------------------------------|--|
| B. d'Amérique<br><i>Bars</i>   |                                       | <i>R. saxatilis</i><br><i>Roccus</i>   |
| B. blanc d'Amérique<br><i>Bars</i>   |                                       | <i>M. americana</i><br><i>Morone</i>   |
| M. noir<br>M. blanc<br>M. rayé<br>M. rouge<br>M. oualioula<br>M. couronné<br>M. badèche<br><i>Mérous</i> | Mérou<br>Tiof                         | <i>E. guaza</i><br><i>E. aeneus</i><br><i>E. striatus</i><br><i>E. morio</i><br><i>E. adscensionis</i><br><i>E. guttatus</i><br><i>E. alexandrinus</i><br><i>Epinephelus</i> |
| C. commun<br><i>Cerniers</i>   | Cabot, mérou                          | <i>P. americanus</i><br><i>Polyprion</i>   |
| S. chèvre<br>S. écriture<br><i>Serrans</i>   | Serran<br>Serran                      | <i>S. cabrilla</i><br><i>S. scribba</i><br><i>Serranus</i>   |
| F. noir d'Amérique<br><i>Fanfres</i>   |                                       | <i>C. striatus</i><br><i>Centropristes</i>   |
| Apogonidés<br>Sonneurs   |                                       | Apogonidae<br>Epigonus   |
| Sonneur commun   | Sonneur                               | <i>E. telescopus</i>   |
| Branchiostegidés<br><i>Tiles</i>   |                                       | Branchiostegidae<br><i>Lopholatilus</i>  |
| T. chameau   |                                       | <i>L. chamaeleonticeps</i>   |
| Centracanthidés<br><i>Picarels</i>   |                                       | Centracanthidae<br><i>Spicara</i>  |
| Mendole<br>Picarel<br>Picarel de l'Atlantique du Sud-Est   |                                       | <i>S. maena</i><br><i>S. smaris</i><br><i>S. melanura</i>  |
| Lutjanidés<br><i>Vivaneaux</i>   |                                       | Lutjanidés<br><i>Lutjanus</i>  |
| V. de mangrove<br>V. argenté<br>V. rouge<br>V. campêche<br>V. gazou                                      |                                       | <i>L. argentimaculatus</i><br><i>L. argentiventris</i><br><i>L. purpureus</i><br><i>L. campechanus</i><br><i>L. synagris</i>   |
| <i>Vivaneaux</i>   |                                       | <i>Aphareus</i>  |
| <i>Vivaneaux</i>   |                                       | <i>Aprion</i>  |
| <i>Vivaneaux</i>   |                                       | <i>Rhomboplites</i>  |
| V. ti-yeux   |                                       | <i>R. aurorubens</i>   |
| <i>Vivaneaux</i>   |                                       | <i>Ocyurus</i>   |
| V. a queue jaune   |                                       | <i>O. chrysurus</i>  |
| Lobotidés<br><i>Croupias</i>   |                                       | Lobotidae<br><i>Lobotes</i>  |
| C. roche   |                                       | <i>L. surinamensis</i>   |
| Pomadasyidés<br><i>Cagnas</i>  |                                       | Pomadasyidae<br><i>Conodon</i>   |
| C. rayée   |                                       | <i>C. nobilis</i>  |