

du chlorure d'éthyle, car la douleur est forte, puis on ouvre avec la pointe d'un bistouri après avoir badigeonné le conduit de tr.-d'Iode.

3°—*Prévenir les récidives*: Matin et soir, on injecte dans le conduit une cuillerée à café d'alcool à 90°—et cela pendant 15 jours.

Se défier des cure-oreilles, des allumettes, des épingles à cheveux pour calmer les démangeaisons. L'eczéma est souvent la cause de ce prurit; il faut le traiter.

CONTRE LA VULVO-VAGINITE DES FILLETES

Injection vaginale, à faible pression, avec une sonde spéciale et une solution de sublimé au quatre millièmes, ou au permanganate de potasse au deux millièmes.

Pendant la nuit, introduire dans le vagin, un crayon dont voici la composition: Salol, 0 gr. 20 cgr.; Beurre de cocoa, 2 gr.

On peut également prescrire, lorsque l'examen des sécrétions a révélé la présence de gonocoques, le protargol qui est spécifique. On emploie une solution selon la formule:

Protargol: 5 grammes.

Eau distillée: 8 grammes.

Glycérine: q. s. ad 50 grammes.

On fait des tamponnements, des badigeonnages et des injections. En outre, l'enfant garde, appliquée sur la vulve, une compresse imbibée de protargol à 1 pour 100, pendant quelques minutes, 3 ou 4 fois par jour. La compresse est maintenue en place par l'adduction des cuisses. La guérison a lieu en 15 ou 20 jours, un mois dans les cas invétérés.

UN TRAITEMENT ABORTIF DU RHUME SIMPLE AIGU

D'après M. le Docteur Frank Eloy (d'Eastbourne), il suffirait pour faire avorter un refroidissement aigu, de pratiquer dès le début de cette affection une injection sous-cutanée d'un demi-milligramme d'atropine et de 1 centigramme de morphine. Quelques minutes après la pituitaire deviendrait complètement sèche et l'irritation de la gorge, les douleurs frontales et en général tous les symptômes morbides disparaîtraient définitivement dans la plupart des cas.

Je n'ai pas d'expérience avec ce traitement, mais je le crois effifacé. Car dans le cas d'un coryza aigu, qui commence, on réussit à le faire