Lamproie noirâtre. *Petromyzon nigricans*, Lesueur. *Fig.* 18. Long. 4 à 7 pouces. Dessus d'un vert bleuâtre; dessous d'un blanc bleuâtre. Pupilles noires; iris argentées. Une petite tache blanche au sommet de la tête entre les yeux. Corps cylindrique en avant, très comprimé à la queue qui se termine en pointe. Ouvertures branchiales en arrière des yeux, d'égale grandeur. Yeux de grandeur moyenne. Bouche circulaire, entourée d'un rebord charnu, armée en dedans de fortes dents recourbées, à base dilatée, les antérieures les plus fortes. La gorge est aussi armée de dents, d'un côté on en voit 3 en triangle, et un peu plus bas se voit un rebord osseux semi-circulaire.

Fig. 18.

Deux nageoires dorsales en arrière du corps, la première arrondie en arrière. La caudale n'est qu'une membrane simple triangulaire s'unissant à l'anale qui est très petite.

Assez commune dans le Golfe, où on la rencontre souvent fixée sur des Morues, des Maqueraux, des Esturgeons, etc.

2. Gen. ICTHYOMYZON, *Icthyomyzon*, Girard.

Bouche circulaire, armée de dents. Yeux ordinaires. Une seule nageoire dorsale. Une seule espèce.

Icthyomyzon brun. *Icthyomyzon castaneus*, Girard.—Angl. *Chesnut Lamprey.*—Long. 6 à 8 pouces. De couleur plombée sur le dos et les flancs, plus pâle sous le ventre. Nageoires brun-foncé. Bouche armée de plusieurs rangs de petites dents recourbées et pointues. Dans la gorge, d'un côté, un rebord osseux, semi-circulaire, portant sept pointes bien prononcées, de l'autre trois grosses dents, dont deux sur le même plan, et la 3e un peu plus bas entre celles-ci. Une seule dorsale vers la moitié du dos. Caudale unie à l anale.

Se rencontre dans le Fleuve St. Laurent, fixée sur des Carpes, des Esturgeons etc.

Fig. 18.—Une Lamproie : *Petromyzon nigricans*, Les.