

La forme clinique la plus commune de ces manifestations méningées est les convulsions classiques ou frustes, généralisées ou partielles, internes ou externes. Plus l'enfant est jeune, plus il a de chances d'avoir des convulsions. Dans la statistique que l'un de nous a communiquée au Congrès de Toulouse (1) nous trouvons, sur 83 cas, 82 au-dessous de deux ans, dont 38 de 0 à six mois. Sur 74 cas, d'Espine (Rapport au Congrès de Toulouse, 1902) en relate 64 au-dessous de deux ans. Haushalter (cité par d'Espine), sur 97 cas de convulsions spasmes de la glotte ou tétanie, en note 93 au-dessous de deux ans, dont 38 au-dessous de six mois.

Ce sont les grandes convulsions, ce que l'on appelle les convulsions externes, qui sont les plus fréquentes; les convulsions internes ou spasme de la glotte sont beaucoup plus rares; quant à la tétanie elle est exceptionnelle, du moins dans certains pays. Nous n'en avons observé aucun cas depuis près de huit ans que nous sommes à Lille.

Il nous paraît inutile d'insister ici sur le tableau clinique que présente l'accès convulsif franc ou fruste. Les auteurs ont suffisamment décrit les différentes phases de l'accès pour que nous n'ayons pas à y revenir. Au reste, qu'il s'agisse de convulsions d'origine intestinale ou de convulsions au cours d'une maladie infectieuse quelconque, fièvres éruptives, pneumonie, etc., le tableau clinique ne varie pas, la convulsion est partielle ou généralisée, externe ou interne, mais l'évolution de la crise ne dépend en rien, pas plus que son intensité, de la nature des accidents morbides qui l'ont provoquée.

Mais ce qu'il nous importe de bien examiner c'est 1° si ces convulsions ne sont que la traduction d'une méningite plus ou moins accentuée; si elles sont l'indice d'une méningite esquissée, si on veut bien nous passer l'expression, ou d'une méningite franche au début, ou s'il s'agit simplement d'un trouble dynamique dans le fonctionnement du système nerveux; 2° comment les poisons gastro-intestinaux peuvent ainsi amener de tels désordres du côté des centres nerveux.

(1) ARSELET. — Les convulsions (Congrès de Toulouse, 1902, et *Echo Médical du Nord*, 20 avr. 1902).