

A la période d'état, recourir à la médication antispasmodique et expectorante.

Chez les *nourrissons* :

Looch blanc du Codex. 60 à 80 grammes
Alcoolature de racines d'aconit. Codex 1884. I à II gouttes

Mêlez.

Ou encore à la formule suivante:

Sirop de Dessesart. 1 gramme
Sirop d'orgeat, q. s. pour. 20 à 80 —
suivant l'âge du petit malade.

Mêlez.

Ces deux préparations seront données par cuillerées à café dans les 24 heures.

Dans la 2^e et 3^e enfance :

Sirop de polygala. 5 grammes
Sirop pectoral. 3 —
Sirop de belladone. 2 —
Eau de laurier-cerise. 1 —
Eau de tilleul. 60 —

En 24 heures.

On peut encore prescrire:

Sirop de latucarium opiace. 3 à 4 grammes
Oxyde blanc d'antimoine. 0 gr. 10
Eau chloroformée. 10 grammes
Julep gommeux. 60 —

En 24 heures.

Mêmes procédés révulsifs que ci-dessus.

A la période de déclin, on donnera:

Chez le *nourrisson* :

Looch blanc du Codex. 60 grammes
Poudre de benjoin. 0 gr. 01 ou. 0 gr. 02

En 24 heures.

Dans la 2^e et 3^e enfance :

Sirop de goudron. 3 grammes
Sirop de térébenthine. 3 —
Eau de tilleul. 60 —

En 24 heures.