

Sous l'influence de cette médication, M. J. Voisin a vu l'excitation maniaque disparaître et la diurèse devenir plus active. En outre, chez les malades ainsi traités, les troubles gastriques dus au bromure de potassium seraient moins prononcés que d'habitude, de sorte qu'on ne serait pas forcé de suspendre aussi souvent l'usage de ce médicament.

—
Mélange pour tarir la sécrétion lactée.—M. BLOOM.

Sulfate d'atropine	0 gr. 003 milligr.
Sulfate de magnésie.....	90 grammes.
Infusion de gentiane.....	240 —

F. S. A. — À prendre par cuillerées à bouche toutes les deux heures.

—
Mixtura antiasthmaticque. — M. CLYMER.

Teinture d'opium.....	4 grammes
Ether sulfurique.....	8 —

Mêlez. — Prendre cinquante gouttes de cette mixtura toutes les demi-heures jusqu'à ce que la crise se soit suffisamment amendée.

—
Mixtura contre le mal de mer. — M. G. W. BARBER.

Chloroforme pur.....	} àà X gouttes.
Teinture de noix vomique.....	
Teinture de lavande composée.....	4 gram.
Eau	35 —

Mêlez. — A prendre : une cuillerée à café toutes les heures jusqu'à cessation des vomissements et des nausées.

Avoir soin de bien agiter le mélange avant de s'en servir.

Un bandage de corps bien serré calme souvent d'une manière rapide les douleurs dues aux violents efforts de vomissement. Lorsque ces douleurs sont particulièrement intenses, quelques prises de morphine peuvent être administrées avec avantage.

Comme alimentation, on prescrira le lait, le thé de bœuf et la gelée de viande, pris en petite quantité, mais à courts intervalles, et on donnera à sucer de petits morceaux de glace.