

un peu, approcha ses lèvres de l'assiette; mais il retomba aussitôt, étant trop faible pour manger. A cet instant, le griffon, enhardi sans doute par la faiblesse de son rival, s'approcha pour s'emparer de la pitance; mais, ô force de la haine et de l'envie! le basset n'eut pas plutôt aperçu le griffon près de l'assiette, qu'il reconvra soudain toute son ancienne vigueur; grondant, aboyant, écumant il se précipite sur son adversaire, qui résiste et qui le combat avec courage. Le basset resta comme mort sur le carreau; mais une réaction salutaire s'en suivit, et l'animal ne tarda à se rétablir.

A continuer.

LES COQUILLES RARES.

(Continué de la page 158.)

LES STRUTHIOLAIRES.

Ce genre renferme des coquilles aux formes peu élégantes, aux couleurs peu brillantes, qui ne sont recherchées dans les collections que pour leur rareté. Elles habitent les côtes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et on n'en connaît que cinq espèces. Toutefois, les voyages modernes ont bien diminué le prix de ces coquilles. Nous citerons les *Struthiolaria crenulata* et *nodulosa*, qu'on trouve maintenant dans toutes les collections, et la *Struthiolaria scutulata* Desh. qui est plus rare.

LE GENRE PRIAMUS.

Ce genre a été créé par le docteur Beck, savant naturaliste danois, pour une coquille classée jusqu'alors parmi les espèces terrestres du genre *Achatina* et désignée par Lamarck sous le nom d'*Achatina Priamus*. Le genre *Achatina* ne renferme que des espèces terrestres, on a dû en distraire l'*Achatina Priamus*, qui est marine, pour en constituer le genre *Priamus*. C'est un des genres les plus curieux en conchyliologie, puisqu'il ne renferme qu'une seule espèce vivante, fort rare et qui tend tous les jours à disparaître. Cette espèce vit sur les côtes d'Espagne, dans le