

Gen. SELANDRIA, Leach, pp. 199, 742 et ci-dessus 7.

Aux 15 espèces décrites, ajoutez les 2 suivantes :

16. Sélandrie montivague. *Selandria montivaga*,
Cress. Trans. Am. Ent. Soc. VIII, 13.

♀—Long. .25 pce. Noire, brillante: le labre d'un blanc-sale. Antennes à peu près de la longueur de la tête et du thorax réunis, grêles, les articles 3 et 4 égaux en longueur. Les pro et mésothorax, l'écusson excepté au sommet, les écaillettes, les flancs excepté 2 taches en dessous plus ou moins confluentes, fauve-ferrugineux. Ailes fuligineuses-pâles, les nervures et le stigma brun, cellule lancéolée pétiolée; ailes inférieures avec une cellule médiane. Les genoux et les jambes antérieures obscurément pâles.

Var. Ecusson tout noir, flancs sans les deux taches noires au bas.—Ottawa (Harrington).

17. Sélandrie inhabile. *Selandria inhabilis*, Harr.
Trans. Am. Ent. Soc. I, 246.

♀—Long. .16 pce. Noire; antennes courtes, filiformes, le second article de la moitié du premier, le terminal court; la face au dessous des ocelles rugueuse et foncée; la labre brun-blanchâtre au sommet; les écailles alaires, le prothorax, le mésothorax et la moitié antérieure des flancs, roux. Abdomen court, presque aussi large que long; le sommet des cuisses et les jambes, pâle, avec plus ou moins de noir au sommet des dernières. Ailes amples, fuligineuses; nervure marginale courbe et reçue près du tiers de la nervure cubitale.

♂—Avec les jambes intermédiaires et postérieures noires.—Ottawa (Harrington).

Fam. II UROCÉRIDES, p. 235.

1. Gen. ORYSSUS, Fabr. p. 237.

A l'espèce décrite, ajoutez les 3 suivantes, qu'on pourra distinguer comme suit les unes des autres.