

de cyanose. 5. L'hypertrophie de la portion spongieuse des os indique le rachitisme. 6. La présence, entre les paupières, d'un liquide épais et purulent sécrété par les glandes de Meibomius, dénote une grande prostration des forces générales. 7. La congestion passive des vaisseaux de la conjonctive indique une mort prochaine. 8. Une lividité se prolongeant longtemps ainsi qu'une lividité produite par le mouvement et l'excitation, la respiration restant normale, sont les indices d'un défaut de conformation du cœur ou des gros vaisseaux. 9. Une lividité temporaire indique l'existence d'une maladie aiguë grave, surtout des organes respiratoires. 10. L'absence de pleurs chez les enfants âgés de 4 mois ou plus dénote une forme de maladie généralement mortelle. 11. Des cris perçants et aigus sont l'indice d'une maladie cérébro-spinale grave. 12. Des mouvements musculaires irréguliers, contrôlés en partie par la volonté durant l'état de veille, indiquent l'existence de la chorée. 13. La contraction des sourcils jointe au fait de tourner la tête et les yeux afin d'éviter la lumière est un signe de céphalalgie. 14. Quand l'enfant se porte la main à la tête, ou cherche à reposer celle-ci sur le sein de sa mère ou de sa nourrice, il souffre de mal d'oreilles. 15. Quand il se porte les doigts à la bouche, en même temps qu'il se montre très agité, il souffre de quelque maladie du larynx. 16. Le fait de se frotter ou de se pincer le nez indique, chez l'enfant, la présence des vers, ou de quelque maladie intestinale. 17. Si l'enfant se tourne constamment la tête de côté et d'autre, songez à quelque obstruction au larynx. 18. Une voix rauque et indistincte doit faire penser à une laryngite. 19. Une voix faible et plaintive indique une maladie des organes abdominaux. 2. Une respiration lente, intermittente et accompagnée de soupirs accuse la présence d'une maladie cérébrale. 21. Si la respiration est intermittente mais accélérée, il y a de la bronchite capillaire. 22. Si elle est superficielle et accélérée, il y a quelque maladie inflammatoire du larynx et de la trachée. 23. Une toux forte et sonore indique l'existence du croup spasmodique. 24. Une toux rauque et rude est l'indice du vrai croup. 25. Quand la toux est claire et distincte, il y a bronchite. 26. Quand elle est supprimée et pénible, il y a pneumonie et pleurésie. 27. Convulsive, elle indique la coqueluche. 28. On observe parfois une toux sèche et non pénible au cours de la fièvre typhoïde et de la fièvre intermittente, d'une dentition difficile et d'une affection vermineuse; dans ces conditions la toux n'est souvent due qu'à une bronchite dont le point de départ a été la maladie première.

—Dr Benj. A. BRADLEY in *Medical Advance*.

Traitement de la coqueluche.—M. le docteur Henri ROGER, dans le cours de la deuxième période de la maladie, conseille l'usage du sirop suivant, de 1 à 6 cuillerées à café par 24 heures, suivant l'âge et l'intensité des symptômes.

Sirop de belladone.....	10 gr.
Sirop de valériane.....	} à 5 gr.
Sirop de digitale.....	

Pour les enfants au-dessous de 2 ans, M. Roger commence par une demi-cuillerée à café, et on augmente d'une demi-cuillerée tous les jours jusqu'au chiffre de deux cuillerées en 24 heures. Pour les coquelu-