

FORMULAIRE THERAPEUTIQUE

Coqueluche. (VEILLARD).

LA COCAÏNE.

Pour diminuer la violence de la coqueluche, on peut badigeonner le pharynx et les amygdales quatre fois par jour avec la solution :

Chlorhydrate de cocaïne 15 grains.

Eau distillée..... 5 drachmes.

(*Journal de médecine de Paris*).

Sirop contre le tænia. (THOMSON).

Chloroforme 1 drachme.

Sirop de sucre 1 once.

Mêlez. — A donner en trois doses égales, la première à sept heures du matin, la seconde à neuf heures, et la troisième à 11 heures. — A midi, le malade avale 35 gram. d'huile de ricin. L'expulsion du tænia a lieu une heure et demie à deux heures après l'ingestion du purgatif.

N. G. — (*Union médicale de Paris*).

Potion contre l'hémoptysie. (GUBLER).

Ergotine Bonjean..... 1 à 2 drachmes.

Acide gallique 10 grains.

Hydrolat de menthe 2 1/2 onces.

Sirop d'essence de térébenthine.... 1 once.

F. s. a. Une potion à donner par cuillerées dans les vingt-quatre heures, aux personnes atteintes d'hémoptysie. — Boissons glacées, repos au lit, sinapismes sur les membres et le thorax successivement.

N. G. — (*Union médicale de Paris*).

Traitement de l'endocardite. (F. BARIÉ).

Comme traitement local, ventouses scarifiées au niveau de la région précordiale, ou applications de glace, ou larges vésicatoires sur la région douloureuse. — Comme traitement général, le Professeur Jaccoud conseille l'emploi d'une potion contenant huit grains de tartre stibié pour l'homme et cinq grains pour la femme. Cette potion doit être prise par cuillerées à bouche toutes les heures. Le traitement est poursuivi pendant deux ou trois jours, suivant l'effet obtenu, en ayant soin de mettre un intervalle de vingt-quatre heures entre chaque jour de médication. Dès la deuxième ou la troisième potion,