tins, blanc. Antennes longues, filiformes, noires, les 3 premiers articles pâles. Lobes du mésothorax très distincts, le médian proéminent. Ecusson et post-écusson tachés de jaune. Métathorax sub-cylindrique, à lignes soulevées peu apparentes. Ailes hyalines, à nervures brunes, aréole petite, triangulaire, oblique. Pattes rousses, les jambes et les tarses plus ou moins obscurs. Abdomen allongé, déprimé, à pédicule assez long, égal dans toute sa longueur, noir avec les sutures entre les segments blanches, de même que l'extrémité. Tarière presque aussi longue que l'abdomen.—R.

Cette espèce s'écarte aussi grandement du type normal des Mésoleptes, surtout par la forme de son abdomen, dont le pédicule est d'égale largeur dans toute sa longeur. La longueur de sa tarière contraste aussi avec toutes les autres espèces.

- 11. Mésolepte effeminé. Mesoleptus muliebris, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. ii, p. 102, &; M. variabilis, Prov. Nat. vii, p. 115, &.
- d—Long. .26 pouce. Noir, brillant; la face, les joues au dessous des yeux, les orbites supérieurs, les palpes, le cou, la suture humérale du prothorax, les écailles alaires avec une tache au dessous, les écussons, les flancs entre les pattes antérieures et intermédiaires, les hanches et les trochantins, d'un beau blanc. Antennes grêles, presque aussi longues que le corps, pâles en dessous et dans le bas. Prothorax trilobé, poli, brillant; métathorax allongé, sans lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, iridescentes, nervures brunes, stigma brunaréole triangulaire, pétiolée. Pattes grêles, jaune-pâle; les hanches postérieures tachées de noir à l'extrémité, les cuisses et les jambes de la même paire plus ou moins obscures extérieurement. Abdomen linéaire, allongé, noir avec une petire bande blanche à la suture de tous les segments, le 1er long, grêle, presque égal dans toute sa longueur.—R.
- 12. Mésolepte honnête. Mesoleptus honestus, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. ii, p. 98, 3.
- d'—Long. .25 pce. D'un roussâtre pâle; la face, les mandibules, les jones, les palpes, le scape en dessous, le collier, les écailles alaires, l'écusson, tous les trochantins avec les 4 hanches antérieures, jaunepâle. Antennes de la longneur du corps, brun foncé à la base, roussâtres à l'extrémité, avec un annéau pâle vers le milieu. Une tache sur les côtés du prothorax avec la région de l'écusson, noir. Métathorax convexe, sans lignes soulevées apparentes. Ailes hyalines, les ner-