

les chances de guérison sont les mêmes chez les tuberculeux prédisposés héréditairement que chez ceux qui ont acquis la tuberculose accidentellement.

On peut acquérir une prédisposition à la tuberculose sans tare héréditaire.

(1) Par l'abus des boissons alcooliques ou par d'autres excès.

(2) Par certaines maladies qui affaiblissent la constitution, comme la pneumonie, la fièvre typhoïde, la variole, la rougeole, la coqueluche, la syphilis, la grippe, etc.

(3) Par certains genres de professions, et en général toutes les professions où les ouvriers exposés aux poussières.

Ceux qui s'adonnent à l'usage excessif des boissons alcooliques ou aux excès de différentes sortes, les convalescents de maladies graves doivent éviter les relations avec les tuberculeux. Les buveurs ne peuvent se mettre à l'abri que s'ils renoncent complètement à leurs habitudes vicieuses. Ceux qui, par leur propre faute ou celle des autres, ont contracté une maladie, doivent se soumettre aussitôt que possible à un traitement médical.

Quant à ce qui concerne les ateliers de travail insalubres, particulièrement les grandes fabriques et les usines, c'est aux pouvoirs publics et aux patrons qu'incombe partout le devoir d'intervenir.

Comment peut-on protéger les petits enfants de la tuberculose ? Tout ce qui a été dit relativement à la prophylaxie de la tuberculose, comme ce que nous allons dire, s'applique aux enfants. Cependant il est bon, puisque le lait est leur nourriture principale, de se préoccuper de leur en donner d'absolument sain. Il y a encore d'autres dangers de contagion pour les enfants. Ainsi quand une mère tuberculeuse embrasse son enfant sur la bouche, lui prépare sa nourriture, emploie sa cuillère pour goûter la bouillie qu'elle prépare, ou savoir si celle-ci n'est pas trop chaude, elle transmet inconsciemment de bouche à bouche les germes de la maladie à l'enfant.

L'enfant jouant souvent sur le plancher peut, en se trouvant tout près du sol, respirer facilement de l'air chargé de bacilles de la tuberculose et devenir phthisique par inhalation ; ou bien encore l'enfant qui touche à tout, porte à sa bouche ses doigts qui ont pu s'infecter, et il peut se produire ainsi chez lui une tubercu-