les broussailles, pond 3 à 4 œufs d'un blanc pur avec seulement quelques taches rouges au gros bout.

4. La Fauvette à poitrine baie. *Dendroica castanea*, Baird.—Angl. *The Bay-breasted Warbler*.—Longueur 5 pouces ; ailes $3\frac{1}{2}$; queue $2\frac{1}{2}$ pouces. Dessus d'un gris bleuâtre, avec stries noires ; couronne, rouge brun ; front, joues et dessus des yeux, noirs ; une tache d'un jaune-brun en arrière des joues ; les primaires et les plumes caudales bordées de gris bleuâtre à l'extérieur, les internes de blanc ; deux bandes sur les ailes et les bords des tertiaires, blancs. Dessous blanchâtre teinté de roussâtre ; le menton, la gorge, et la partie supérieure de la poitrine avec les côtés, d'un brun châtaigne ; les 2 plumes caudales externes avec une tache blanche au bord interne.

P. R. R. Cette Fauvette est très rare dans Québec ; il n'est pas même certain qu'on l'y ait jamais rencontrée.

5. La Fauvette des Pins. *Dendroica Pinus*, Baird. *Sylvia*. Wils.—Angl. *The Pine creeping Warbler*.—Longueur $5\frac{1}{2}$ pouces ; ailes 3 ; queue $2\frac{1}{2}$ pouces. Parties supérieures d'un vert-olive clair presque uniforme, les plumes de la couronne avec la tige un peu plus foncée ; dessous d'un jaune brillant, excepté le milieu du ventre qui est blanc ; des stries brunes sur les côtés de la poitrine et du corps ; les paupières avec une tache en arrière de l'œil, d'un jaune obscur ; ailes et queue brunes ; deux bandes à travers les couvertures d'un blanc sale ; le bord interne avec environ le tiers terminal des plumes caudales, d'un blanc sale.

E. C. Cette Fauvette arrive de bonne heure au printemps ; elle niche dans les pins et les sapins, pond 4 à 5 œufs d'un blanc bleuâtre avec une légère teinte de rose, et tachés de rouge et de brun.

6. La Fauvette de Pennsylvanie. *Dendroica Pennsylvanica*, Baird. *Sylvia icterocephala*, Aud. Angl. *The Chesnut-sided Warbler*. Longueur 5 pouces ; ailes $2\frac{1}{2}$; queue $2\frac{1}{3}$ pouces. Dessus strié de noir et de gris bleuâtre, qui passe au blanc près des épaules ; le milieu du dos d'un vert jaunâtre ; la couronne jaune, bordée de blanc ; une ligne noire au-dessus et au-dessous des yeux ; les oreilles, la paupière inférieure et tout le dessous, d'un blanc pur, avec les côtés châtains ; ailes et queue d'un brun foncé, avec les plumes lisérées de gris bleuâtre, à l'exception des secondaires et des tertiaires qui sont bordées de vert-jaunâtre ; les épaules avec deux bandes blanches ; les trois plumes caudales extérieures avec des taches blanches sur le bord interne, vers l'extrémité.