

- L., indigène.—1 an et 2 ans, 12 pcs.—Jaune 1/6 pc.; grappes allongées; cosses petites, moins de 1 pc., sur pédicelles grêles étalés. Graines.—Champs de grain, jachères, lieux incultes.—Labourer automne et printemps, arracher avant maturation des graines.
- Vélar d'Orient; Hare's-ear Mustard.—*Coringia orientalis* (L.), Andr., Europe.—1 an, 1-2 1/2 pls.—Blanc crème, 1/4 pc.; grappes allongées; cosses - pcs, carrées, ascendantes; feuilles tout à fait lisses, entières, succulentes, glauques.—Graines.—Champs de grain.—Arracher, jachérer, plantes sarclées.
- Sisymbre à feuilles découpées; Cutleaved Tansy Mustard.—*Sisymbrium incisum*, Engelm., indigène.—1 an et 2 ans, 1-4 pls.—Jaune, 1*3 pc.; grappes allongées; cosses lisses, étalées, arquées, 3/4 pc.; graines sur 1 rang; feuilles minces, vertes, presque sans pois.—Graines.—Champ de grain, jachères.—Arracher, jachérer, plantes sarclées.
- Sisymbre touffu; Crowded Tansy Mustard.—*Sisymbrium incisum*, var., *Hartwigianum*, Watson, indigène.—2 ans, 1-4 pieds.—Comme précédent, mais cosses courtes, environ 1/4 pc., ascendantes, serrées contre la tige, en grappe touffue; graines sur 1 ou 2 rangs.—Graines.—Champs de grain, jachères. Se voit souvent sur les toits en gazon dans l'Ouest.—Arracher, jachérer, plantes sarclées.
- Sisymbre sagesse, Sagesse des chirurgiens; Tansy Mustard.—*Sisymbrium canescens*, Nuaa., indigène.—1 an, 12 pcs.—Comme précédent, mais plus petit, généralement plus branchu et plus gris; feuilles finement découpées; cosses 1/3-1/2 pc., sur pédicules d'égale longueur, ascendants; graines sur 2 rangs.—Graines.—Champs de grain, jachères. Se voit souvent sur les toits en gazon dans l'Ouest.—Arracher, jachérer, plantes sarclées.
- Moutarde roulante; Tumbling Mustard.—*Sisymbrium altissimum*, L., (= *S. sinapistrum*, Crantz), Europe.—1 an et ann. d'hiver, 1-4 pls.—Jaune pâle, 1/3 pc., grappes allongées; cosses 2-4 pcs, très grêles, étalées; graines brun verdâtre.—Graines; vent.—Champs de grain.—Arracher, jachérer, plantes sarclées.
- Sénévé, Moutarde des champs; Wild Mustard, Charlock.—*Brassica Sinapistrum*, Boiss., Europe.—1 an, 1-3 pds.—Jaune, 1/2 pc., grappes dressées, 1-1 1/2 pc., un tiers vides ou à 1 graine, hecs à deux tranchants; tiges poilues, violacées aux nœuds.—Graines, dans le grain.—Champs de grain.—Arracher, jachérer, plantes sarclées.
- Navet sauvage, Bird Rape.—*Brassica campestris*, L. Europe.—1 an, 1-3 pds.—Jaune vif, 1/2 pc.; grappes; cosses 1 1/4-2 1/2 pcs, étalées; tiges parfaitement lisses, glauques.—Graines dans le grain.—Champs de grain.—Arracher, jachérer, plantes sarclées.