

REVUE GENERALE

I. ROUGEOLE.

Maladie épidémique généralement peu grave, mais exigeant des soins attentifs, conférant ordinairement l'immunité après une première attaque. Survient en général chez les enfants.

Période d'incubation. — 8 à 15 jours, quelques malaises.

Période de début ou d'invasion. — Fièvre, 39 à 40°, catarrhe oculo-naso-laryngé et bronchique. Larmoiement, jetage, toux. Epistaxis, adénite sous-maxillaire, légère angine à pointillé rouge.

Période d'éruption. — Début par la face, ensuite tronc et membres. Se complète en 24 à 48 heures: le catarrhe bronchique augmente, parfois diarrhée.

Période de desquamation. — Débute par la face, aspect furfuracé, coïncide avec l'amendement des autres symptômes.

Complications. — Infections secondaires, diphtérie, tuberculose, pneumonie lobulaire, orite, complications oculaires variables (kérato-conjonctivite).

Formes. — Nerveuse, avec délire, coma, convulsions. Dyspnéique, où les complications broncho-pulmonaires prédominent. Hémorrhagique, très grave.

TRAITEMENT.

Prophylaxie. — Insister pour obtenir l'isolement, surtout s'il existe des enfants en bas âge dans la même famille. La garde-malade devra s'isoler avec l'enfant. Les selles, crachats, linges, ustensiles, seront désinfectés par une solution de sulfate de cuivre à 45 pour 1,000.

Règles hygiéniques. — Chambre vaste, bien aérée, 16° à 18°, bien éclairée; saturer l'air de vapeur antiseptiques, 1 cuillerée à soupe d'eau de :

SOLUTION :

Acide phénique.....	50 grammes
— thymique	10 —
Encalyptol	10 —
Alcool à 30°.....	100 —