

interdum fere truncata, ad apicem inequaliter serrata; supra flavescenti-viridia, pilis adpressis subsericis dense obiecta, subtus pulchrè niveo-tomentosa, ad margines pilis mollibus exsertis hirsuta: exteriora minora. Folium unicum prope basin caulis saepius ternatum. Adsunt quoque ad originem pedunculorum foliola duo opposita simplicissima sericea stipulis insidentia. *Pedunculi* 2-3, unguiculares, ascendentes dum terni laterales medio bibracteati, tertius nudus. *Calyces* villosi, lacinii exterioribus brevioribus linearibus acutis; interioribus triplo latioribus semi-ovatis acuminatis corollam vix æquantibus. *Petala* flavissima latè obcordata. *Germina* levia, receptaculo hirsuto. Species pulchra. *P. humifusam Nuttallii* non vidi, sed à plantâ nostrâ diversa videtur propter caules flagellatos et non foliosos.

193. *P. nivea*: Willd. ii. p. 1109. Pursh. i. p. 353. (B.)

194. *P. hirsuta*: Nestl. Monogr. p. 67. t. 9. *P. Monspeliensis*. Willd. ii. p. 1109. (S.)

195. *P. tridentata*: Willd. ii. p. 1110. Pursh. i. p. 353. (W.)

196. *P. biflora*: Lehman. Monogr. p. 192. No. 88. t. 20. (B.)

Dense cæspitosa. *Folia* gramineo-viridia subtus glauca, marginibus revolutis, apicibus fuscis. *Flos* erectus plerumque solitarius sæpe tamen flores duo terminales, pedicellis brevibus villosis ebracteatis ex axillis foliorum caulnorum. *Calyx*, lacinii exterioribus linearibus, marginibus revolutis, utrinque rotundatis subtusque glaucis; interioribus longitudine æqualibus, duplo latioribus ovatis, acuminatis planiusculis. *Petala* calyce duplo grandiora, obcordata citrino-flava ad unguem maculâ aurantio-flavâ ornata. *Styli* flavi subulati, curvi, staminibus breviores. *Receptaculum* dense villosum, germinibus rugulosis.

197. *Geum triflorum*: Pursh. ii. p. 736. Nuttall. i. p. 309. (C.)

198. *G. strictum*: Willd. ii. p. 1113. Pursh. i. p. 351. (W.)

199. *Dryas chamædrifolia*: Pers. Ench. ii. p. 57. Pursh. i. p. 350. (W.)

200. *D. integrifolium*: Pers. Ench. ii. p. 57. (B.)

201. *Comarum palustre*: Willd. ii. p. 1119. Pursh. i. p. 357. (W.)

POLYANDRIA.

202. *Actæa brachypetala*: Decand. Syst. i. p. 385. *A. Americana*: Pursh. ii. p. 366. (W.)

203. *Papaver nudicaule*: Willd. ii. p. 1145. Pursh. ii. p. 365. (B.)

204. *Sarracenia purpurea*: Willd. ii. p. 1150. Pursh. ii. p. 367. (W.)

205. *Nuphar lutea*: Pursh. i. p. 369. (W.)

206. *Aquilegia vulgaris*: Willd. ii. p. 1245? (W.)

207. *Thalictrum corynellum*: Decand. Syst. i. p. 1172? Th. Cornuti: Pursh. ii. p. 388? (W.)

208. *Anemone Nuttalliana*: Decand. Syst. i. p. 193. *A. Ludoviciana*: Nutt. Am. ii. p. 20. (W. C.)

209. *A. parviflora*: Decand. Syst. i. p. 200. Mich. Am. i. p. 319. (W. B.)

210. *A. ranunculoides*? var: Decand. Syst. i. p. 206? (H. B.)

Involucri foliola latè obovata vix in petiolos attenuata.

211. *An. borealis*: foliis ternatis: segmentis rotundatis dentatis crenatisve; involucri albus amplexicaulibus trifidis, petalis 6 obovatis. (B.)