

dans le canton d'Enniskillen et dans le canton de Mosa, près de Bothwell. Les trois gisements connus sous les noms de Oil Springs, Petrolia et Bothwell furent ouverts. Le gisement près de Bothwell fut abandonné en 1866; mais les deux autres ont continué de produire sans interruption jusqu'à présent. Plusieurs des premiers puits forés à Oil Springs et à Petrolia étaient des puits jaillissants et un grand nombre d'entre eux ont produit, chacun, plusieurs milliers de barils par jour. Ils cessèrent bientôt de jaillir, et depuis, on y a puisé l'huile au moyen de pompes. La production a considérablement diminué, et elle n'est plus que de quelques gallons par puits et par jour, en moyenne.

Les gisements de Petrolia et d'Oil Springs ont continué de donner un rendement important jusqu'à ces dernières années. La diminution du rendement était compensée par la découverte, de temps à autre, de nouvelles nappes; mais cela n'a été que temporaire, car les nouvelles nappes découvertes étaient d'un très faible volume ou s'épuisaient rapidement.

Après 1880, le petit gisement d'Euphemia fut découvert, et des explorations dans le canton de Zone aboutirent à l'ouverture du nouveau gisement de Bothwell en 1896. C'est un des plus importants gisements, et il a donné sans interruption un rendement constant jusqu'à ce jour. Le gisement de Dawn a été ouvert en 1897, et ceux de Dutton et de London Road, en 1898. Le petit gisement de Raleigh, où l'on a atteint la nappe jaillissante de Gurd, a été ouvert en 1902. Le gisement pétrolifère de Moore a été ouvert en 1904; quelques-uns des puits qui y furent forés eurent un rendement initial de 40 à 100 barils par jour. L'huile fut pour la première fois découverte dans le gisement de Tilbury au mois de décembre, 1905; les travaux de forage furent activement poussés en 1906, et la production, en 1907, s'élevait à 344,358 barils, ou à 44 pour cent de la production totale de la province. Malheureusement, le rendement a baissé vite. D'autres gisements restreints qui ont été mis à jour récemment sont celui de Kipp, dans la partie nord du canton de Raleigh; celui de Mersea; celui de Romney, découvert en 1906 dans la partie est du canton de Romney; celui de Wheatley, dans la partie sud-ouest de Romney; celui