

---

---

# LE MONTRÉAL-MÉDICAL

Vol. 9

25 Août 1909

N° 6

---

---

## Forme trophique du tabes

Par M. le Professeur RAYMOND

---

Un homme a, depuis quatre ans, une déformation du pied gauche, consistant en une saillie anormale des malléoles, qui sont volumineuses, dures, avec ankylose de l'articulation tibio-tarsienne. Cela est survenu brusquement, sans douleur. La marche n'a été gênée que dans ces derniers temps. Pendant treize ans et demi, il a pu aller et venir et exercer un dur métier.

Actuellement, on constate le signe de Romberg. Les réflexes tendineux sont perdus. On note chez lui la chute spontanée des dents. Il a eu des douleurs fulgurantes, de la diplopie transitoire. La pupille droite ne réagit plus à la lumière, la gauche est paresseuse.

C'est donc un tabétique. La lésion du pied est une arthropathie tabétique, une exostose par ostéite condensante, c'est-à-dire un trouble trophique. On trouve en outre sur la malléole une cicatrice de *mal perforant malléolaire*, analogue au mal perforant plantaire. Aux coudes on constate une exostose de l'olécrâne.

Le malade a contracté la syphilis à 19 ans et n'a jamais suivi de traitement. L'arthropathie du pied fut la première manifestation morbide.

C'est un *tabès trophique*. Cette forme du tabès doit être connue, prévue et soupçonnée.

La localisation de l'arthropathie tabétique sur l'articula-