

phénylpropanolamine
 pipradol
 prolintane
 propylhexédrine
 pyrovalérone
 strychnine

et substances apparentées

B. Analgésiques narcotiques tels que :

alphaprodine
 aniléridine
 buprénorphine
 codéine
 dextromoramide
 dextropropoxyphène
 diamorphine (héroïne)
 dihydrocodéine
 dipipanone
 éthoheptazine
 éthylmorphine
 lévorphanol
 méthadone
 morphine
 nalbuphine
 pentazocine
 péthidine
 phénazocine
 trimepéridine

et substances apparentées

C. Stéroïdes anabolisants tels que :

bolastérone
 boldénone
 clostébol
 dehydrochlorméthyltestostérone
 fluoxymestérone
 mestérolone
 méthandiénone
 méténolone
 méthyltestostérone
 nandrolone
 noréthandrolone
 oxandrolone
 oxymestérone
 oxymétholone
 stanozolol
 testostérone*

et substances apparentées

D. Bêta-bloquants tels que :

acébutolol
 alprénolol
 atémolol
 labétalol
 métoprolol
 nadolol
 oxprénolol
 propranolol
 sotalol

et substances apparentées

* Pour la testostérone, un échantillon sera considéré comme positif si l'administration de testostérone ou toute autre manipulation a pour résultat l'obtention d'un taux de testostérone/épitestostérone dans les urines supérieur à 6.