

Attitude vicieuse du membre en rotation externe et en adduction.

Raccourcissement avec ascension du grand trochanter.

*Symptômes propres à la fracture du Col.*

- 1o.—Rotation externe en partie corrigible.
- 2o.—Raccourcissement souvent minime au début mais progressif.
- 3o—Gonflement douloureux de la base du triangle de Scarpa.
- 4o.—Douleur à la pression au niveau des vaisseaux fémoraux.

*Symptômes propres à la fracture de la région troch.*

- 1o.—Rotation ext. difficilement ou impossible à corriger.
- 2o.—Raccourcissement fixe.
- 3o.—Pas de gonflement de la base du triangle de Scarpa.
- 4o.—Douleur externe au niveau du bord interne du courtier.

Avant d'étudier le traitement n'oublions pas que la fracture du col évolue très fréquemment vers l'apseudarthrose et que les fractures de la région trochantérienne évoluent vers une consolidation presque constante.

*Traitemen.*

Le traitement comprendra :

- La Réduction.
- La Contention.
- L'Immobilisation.

En pratique il est beaucoup plus difficile de traiter une fracture de l'extrémité supérieure du fémur que ne le montre certains auteurs.

Un grand nombre de ces blessés, sont des malades très âgés, obèses, insuffisants cardiaques, emphysémateux, bronchitique